

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ & ΕΛΙΑΣ

(ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

ΑΜΠΕΛΙ



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγα.



Ωιδιο. Κηλίδες στην πάνω επιφάνεια του φύλλου.



Περονόσπορος. Κηλίδες στην πάνω επιφάνεια του φύλλου.

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός

12α.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)

Η δραστηριότητα του εντόμου ξεκίνησε και στις όψιμες περιοχές του νομού Χανίων.

Στις όψιμες περιοχές συνιστάται ψεκασμός στις: 22 - 24 Ιουνίου

Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές του νομού Χανίων αυξάνονται οι συλλήψεις κι η δραστηριότητα του εντόμου.

Στις πρώιμες περιοχές συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός το διάστημα: 21 - 23 Ιουνίου.

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

<p>ΩΙΔΙΟ (σίρικας) : (<i>Erysiphe necator</i>)</p>	<p>Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια και τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα. Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Σε αμπέλια με εκτεταμένες προσβολές να προτιμηθεί το θείο σε σκόνη επίπασης.</p>
<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Η ασθένεια επεκτείνεται κι έχει εμφανιστεί σε νέες θέσεις όπως προβλεπόταν. Η καιρική αστάθεια που επικρατεί (βροχές, δροσιές) εξαπλώνουν περαιτέρω την ασθένεια. Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωίδιο. <u>Αμπέλια με συμπτώματα, σε επόμενες βροχές και σε περιόδους με έντονες δροσιές, πρέπει να είναι προστατευμένα.</u></p>

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια που έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΕΧΘΡΟΙ ΕΛΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

Πληροφορίες: Ν. Ι. Μπαγκής, MSc Μ.Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Α.Γ. Καλλιουάκη



Μαργαρόνια: προσβολή ακραίας βλάστησης.



Λεκάνιο: Προσβολή από λεκάνιο και ανάπτυξη καπνιάς.



Λεκάνιο: Εκκολάψεις και νεαρές έρπουσες σε ενήλικο ωτοκίας.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

<p>ΛΕΚΑΝΙΟ: (<i>Saissetia oleae</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Συστάσεις:</p>	<p>Ευνοείται σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία και σε δέντρα με πυκνό φύλλωμα. Εγκαθίσταται στα κλαδιά και στα φύλλα και σε έντονες προσβολές αναπτύσσονται δευτερογενώς πάνω στα μελιτώματά του μύκητες της καπνιάς προκαλώντας εξασθένηση των δέντρων.</p> <p>- Οι προσβολές περιορίζονται με κατάλληλο κλάδεμα που εξασφαλίζει καλό αερισμό και φωτισμό στο εσωτερικό μέρος των δέντρων.</p> <p>- Συστήνεται επέμβαση <u>μόνο στα δέντρα που παρατηρούνται σοβαρές προσβολές:</u></p> <p>Πρώιμες - παραλιακές περιοχές: 26 - 28 Ιουνίου</p> <p>Μεσοπρώιμες περιοχές : 29 - 31 Ιουνίου</p> <p>Όψιμες περιοχές : 3 - 5 Ιουλίου</p> <p>Για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων προτείνεται η χρήση <u>εντομοκτόνων χαμηλής τοξικότητας</u>. Όταν χρησιμοποιούνται παραφινικά λάδια τα δέντρα πρέπει να είναι καλά ποτισμένα και η θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 32° C.</p>
<p>ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: (<i>Palpita unionalis</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Ανάγκη προστασίας έχουν <u>μόνο νεαρά δέντρα</u> σε φυτώρια και νέους ελαιώνες.</p> <p>Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και τους νέους ελαιώνες <u>σε όλες τις περιοχές του νομού Χανίων</u>.</p>

Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών της αμπέλου και της ελιάς να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε στείλει.

Τα Δελτία αμπελιού και ελιάς για το νομό Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία με το Τ.Α.Α. Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Ηράκλειο 19 Ιουνίου 2015

Η Προϊστάμενη Τμήματος

a.a.

Οικονομάκη Ροζάνα