

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ

(ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

ΣΤΑΔΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ



Άνθηση



Πτώση πετάλων - Καρπόδεση



Νεαρό καρπίδιο

ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Πράσινη κορυφή



Ρόδινη κορυφή



Έναρξη άνθησης



Άνθηση



Προσβολή καρπίδιου αχλαδιάς
από φουζικλάδι.



Προσβολή ωιδίου σε νεαρή βλάστηση
μηλιάς.



«Καμμένα» άνθη αχλαδιάς από
βακτηριακό κάψιμο.

Με σημαντική ανομοιομορφία εξελίσσονται τα βλαστικά στάδια στις μηλιές και στις αχλαδιές. Στις ορεινές περιοχές (Οροπέδιο Λασιθίου, Λιβιάδι Κρουσώνα, Δαμάστα) κυρίαρχα βλαστικά στάδια είναι η ρόδινη κορυφή – έναρξη άνθησης στις μηλιές και η πτώση πετάλων – καρπόδεση στις αχλαδιές.

<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Venturia inaequalis</i>) (Μηλιά) (<i>Venturia pirina</i>) (Αχλαδιά)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν δεν ευνοούν την ασθένεια. - Στις μηλιές οι πρώτες μολύνσεις απαιτούν βροχές ενώ στις αχλαδιές αρκούν οι έντονες δροσιές. - Η κρίσιμη περίοδος για τις πρώτες μολύνσεις είναι μέχρι το στάδιο του καρπιδίου. - Εφόσον προβλέπεται βροχή κάνετε ψεκασμό πριν ή το συντομότερο δυνατόν μετά από τη βροχή, τόσο σε μηλιές όσο και σε αχλαδιές. - Στις αχλαδιές να γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί και σε περιόδους με συχνές και έντονες δροσιές. - Στις μηλιές οι επεμβάσεις να συνδυάζονται με αυτές του ωιδίου.
<p>ΩΙΔΙΟ : (Μηλιά) (<i>Oidium farinosum</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Το μόλυσμα υπάρχει μέσα στα μάτια και ξεκινά με την βλάστηση. - Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. - Η τρυφερή βλάστηση είναι ευαίσθητη όλη την καλλιεργητική περίοδο ενώ οι καρποί προσβάλλονται κυρίως σε νεαρό στάδιο. - Η πρόωπη αντιμετώπιση του ωιδίου περιορίζει σημαντικά τις προσβολές. <p>Οδηγίες: Στις μηλιές να γίνει προστασία για το ωίδιο. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για το φουζικλάδιο.</p>
<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (<i>Erwinia amylovora</i>) (Αχλαδιά)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Το βακτήριο προκαλεί οικονομική ζημιά στις αχλαδιές. - Η ποικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα είναι πολύ ευαίσθητη. <p>Ελέγχετε τακτικά τις αχλαδιές. Τμήματα ύποπτα με συμπτώματα σε φύλλα, νεαρούς βλαστούς και καρπούς (σαν να είναι “καμένα” από φωτιά) πρέπει να αφαιρούνται με ξηρό καιρό μαζί με υγιές τμήμα 20-25 εκατοστών και να καταστρέφονται άμεσα. Το βακτήριο μεταδίδεται με τα εργαλεία αφαίρεσης και γι’ αυτό καλό είναι να απολυμαίνονται τακτικά με οινόπνευμα του εμπορίου.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών έτους 2016, για την αντιμετώπιση των κύριων ασθενειών της μηλιάς και αχλαδιάς στην Κρήτη, τις οποίες παρακαλούμε **να κρατήσετε σε αρχείο**. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου επιλέγεται τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.

Ηράκλειο 7 Απριλίου 2016
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη