



## No 17 / 30 Μαΐου 2013

Υφούλης Αντώνης  
Λαΐδου Ιωάννα  
Μακρίδου Ευγενία

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

**ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ***(Pseudaulacaspis pentagona Targioni, Homoptera: Diaspididae)*

- Ξεκίνησε η 1<sup>η</sup> πτήση του εντόμου..
- Προσβάλλει και την ακτινιδιά.
- Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται καταπολέμηση. Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

	Οπωρώνες με σοβαρές προσβολές	Οπωρώνες με μειωμένες προσβολές	Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
<b>ΠΕΔΙΝΕΣ-ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ</b>	<b>15 – 17 Ιουνίου</b>		Fenoxycarb (1)
	<b>4-7 Ιουνίου</b> και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	<b>13-16 Ιουνίου</b>	Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (2), Fatty acid potassium salt (4), Paraffin oil (4)
<b>ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ</b>	<b>22 – 24 Ιουνίου</b>		Fenoxycarb (1)
	<b>10-13 Ιουνίου</b> και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	<b>18-21 Ιουνίου</b>	Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (2), Fatty acid potassium salt (4), Paraffin oil (4)

**ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ***(Cydia funebrana Treitschke, Lepidoptera: Tortricidae)*

- Η πτήση των ενήλικων της 2<sup>ης</sup> γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης:
  - Diflubenzuron **έως 2 Ιουνίου**.
  - Chlorpyrifos, Deltamethrin **3-5 Ιουνίου**.

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.