


# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα)  
Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα  
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707  
Fax: 26510 41902



## ΑΜΠΕΛΙ



1

2

3

4

5

6

7

ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος,

6. 17 / 6 /2013

Βλαστικό στάδιο: Από καρπόδεση (Ζίτσα), έως πριν «Κλείσιμο» τσαμπιού (Κέρκυρα, Λευκάδα, Σακελλαρικό Ιωαννίνων).

### ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Η πίεση προσβολής είναι μηδενική. Έχουν αναφερθεί μόνο σπάνιες μεμονωμένες κηλίδες. Στο εξής να γίνουν μόνο 1-2 ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα (κυρίως για την σκλήρυνση της βλάστησης). Στο ερχόμενο δεκαήμερο δεν αναμένονται βροχοπτώσεις.

### ΩΙΔΙΟ (ΜΕΛΟΥΔΑ)

Οι συνθήκες που επικρατούν στην Κέρκυρα και την Λευκάδα και πλέον και στην Ζίτσα Ιωαννίνων είναι άριστες για την εξάπλωση του παθογόνου. Να συνεχιστεί η προστασία σε όλες τις περιοχές μέχρι και το «γυάλισμα» του σταφυλιού. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα στα ακόλουθα διαστήματα:

|   |              |
|---|--------------|
| Βρέξιμο θείο ή επίπασης, μεπυλντινοκάπ κ.α. επαφής.   | 5-7 ημέρες   |
| Μυκλομπουτανίλ, πενκοναζόλ, συπροκοναζόλ, τριαντιμενόλ, τεμπουκοναζόλ, σπιροξαμίν, (κ.α. παρεμποδιστές βιοσύνθεσης στερόλης). | 10-12 ημέρες |
| Πυρακλοστρομπίν, προκιναζίντ, μετραφενόν, τριφλοξιστρομπίν, κρεζοξίμ (+μποσκαλίντ), κινοξιφέν, αζοξυστρομπίν.                 | 12-14 ημέρες |

## **ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

Στα βλαστικά στάδια πριν το «κλείσιμο» του τσαμπιού και στο «γυάλισμα» του σταφυλιού, να γίνουν ψεκασμοί με ειδικό βοτρυδιοκτόνο σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα Μαλαγουζιά κ. α.) και στα αμπέλια που σημειώνονται σαπίσματα κάθε χρονιά. Οι εφαρμογές σκευασμάτων μπορεί να στοχεύουν μόνο την ζώνη των σταφυλιών. Ο ψεκασμός μπορεί να συνδυαστεί με την καταπολέμηση του ωιδίου (σ' αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή γίνεται σε όλη την βλαστική επιφάνεια).

**Κατάλληλα φάρμακα:** βλ Λίστα που σας έχει σταλεί.

## **ΕΥΔΕΜΙΔΑ**

Οι πληθυσμοί είναι πολύ μικροί, κανένας ψεκασμός δεν είναι επιβεβλημένος σε καμία περιοχή του νομού Ιωαννίνων.

Η πτήση της δεύτερης γενιάς εξελίσσεται στην Λευκάδα και την Κέρκυρα. Σε αμπελώνες όπου κατά την πρώτη γενιά βρέθηκαν με καταμέτρηση πάνω από 20-30 φωλιές διατροφής σε 100 τσαμπιά μπορεί να γίνει 1 ψεκασμός με την λήψη του δελτίου. Στις αρχές Ιουλίου να γίνει καταμέτρηση των φωλιών διατροφής-προσβολών σε όλους τους αμπελώνες .

**Κατάλληλα φάρμακα:** βλ Λίστα που σας έχει σταλεί.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ :**

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάσετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτήν.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΙΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη  
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα  
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο:

(<http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings/>).