


ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 30 / 3 Ιουνίου 2015

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Η 1^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	10-12 Ιουνίου*	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	4-6 Ιουνίου * και επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες	Methoxyfenozide (3)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	10-12 Ιουνίου* και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Chlorpyrifos (2), Chlorpyrifos-methyl (1), Deltamethrin (1), Etofenprox (2), Indoxacarb (3), Lambda cyhalothrin (2)

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- *Οι προτεινόμενες ημερομηνίες υπολογίστηκαν με την προϋπόθεση ότι έγινε επέμβαση για την Ανάρσια, όπως προτάθηκε στο δελτίο νο 25-15/5.
- Η επέμβαση για τον Φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και την Ανάρσια (*Anarsia lineatella* Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae) και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαμα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

A. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (*Venturia inaequalis* Cooke Wint. *Venturia pirina* Aderhold)

ΩΙΔΙΟ (*Podosphaera leucotricha* Ell. and Ev. Salm.)

- Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών και αναμένονται ξανά βροχοπτώσεις προς το τέλος της εβδομάδας. Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.
- Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων δόθηκαν στο δελτίο νο 26/18-5-15.

B. ΣΑΝ ΖΟΖΕ, Ψώρα του San José (*Quadraspidiotus perniciosus*, Homoptera: Diaspididae)

- Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προנוμφών (έρπουσες).
- Οι επεμβάσεις για την Καρπόκαψα της Μηλιάς (Δελτίο 26/18-05-15) επιτυγχάνουν ικανοποιητική καταπολέμηση του Σαν Ζοζέ. Μόνο σε **σοβαρές προσβολές** συστήνεται ξεχωριστή επέμβαση 12-14 Ιουνίου. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Fenoxycarb, Paraffin oil, Spirotetramat.

ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ- ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ

(*Rhagoletis cerasi* Loew, Diptera: Tephritidae)

- Ξεκίνησε η πτήση του εντόμου.
- Συνιστάται επέμβαση **από 6 Ιουνίου** μόλις ξεκινήσει η αλλαγή χρώματος στον καρπό από πράσινο σε υποκίτρινο.
- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται ήδη δεν απαιτείται επέμβαση.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες	μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή
Beauveria bassiana	5 (κάθε 7 ημέρες)	0
Deltamethrin	1	7
Thiamethoxam	2	7

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- **Μεγάλη προσοχή** να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Νικολάου Σταυρούλα