

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Εντομοκτόνα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΧΘΡΟΣ													ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Ακάρεια	Άσπρη ψώρα	Βαμβακάδα	Δάκος	Θρίπες	Κοκκοειδή	Λεκάριο	Μυτλόμορφη ψώρα	Παρλατόρια	Πολλίνα	Μαργαρόνια	Πυρηνοτρήτης	Ρυχίτης	
paraffin oil	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			21
Dimethoate				✓										28
Alpha-cypermethrin				✓										7 (Δολωματικός)
Beauveria bassiana				✓										Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Beta - cyfluthrin				✓								✓		14 (Δολωματικός ψεκασμός) & 56 ημέρες με ψεκασμό κάλυψης
Deltamethrin			✓	✓	✓		✓					✓		7
Lambda cyhalothrin				✓								✓		7 ή 14 ή 120 (ανάλογα με το σκεύασμα και τον τρόπο ψεκασμού).
Pyrethrins				✓								✓		2
Spinosad				✓										14 (δολωματικός ψεκασμός)
Thiacloprid				✓										14 (δολωματικός & ψεκασμός φυλλώματος)
Thiacloprid + deltamethrin				✓								✓		14 (Πυρηνοτρήτης μόνο στην καρπόβια γενιά)
Thiametoxame + I-cyhalothrin												✓	✓	7 (Πυρηνοτρήτης μόνο στην καρπόβια γενιά)
Bacillus thuringiensis												✓		Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Chlorpyrifos-methyl							✓					✓		60
Diflubenzuron												✓		στην αρχή της άνθησης
Fenoxycarb							✓							60
Ρυγίροxyfen (Δευτερεύουσα δράση στην ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ)							✓		✓					Δεν ορίζεται λόγω του συνιστώμενου χρόνου εφαρμογής (πριν την άνθιση)
urea				✓										εντομοελκυστικά
hydrolysed proteins				✓										εντομοελκυστικά

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καβάλα, 19/03/2015