


ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 44 / 27 Ιουλίου 2016

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ - ΑΝΑΡΣΙΑ - ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, **Lepidoptera: Gelechiidae**,

Anarsia lineatella Zeller, **Lepidoptera: Gelechiidae**,

Grapholitha molesta Busck, **Lepidoptera: Tortricidae**)

- Ξεκίνησε η 3^η πτήση του Φυλλοδέτη με μειωμένες συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Η πτήση της Ανάρσιας συνεχίζεται με ιδιαίτερα σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Ο Βλαστορύκτης (Καρπόκαψα ροδακινιάς) εμφανίζει πολύ αυξημένες συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Η επέμβαση πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με την ημερομηνία συγκομιδής της κάθε ποικιλίας.
- Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης με βάση τις πτήσεις και των τριών εντόμων και ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	5-7 Αυγούστου	<i>Bacillus thuringiensis</i> spp. Aizawai (2), <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	1-3 Αυγούστου	Methoxyfenozide (3)	7
		Chlorantraniliprole (2)	14
		Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2)	14
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	5-7 Αυγούστου	Beta-cyfluthrin (2)	7
		Deltamethrin (1-2)	7
		Emamectin (3)	7
		Etofenprox (2)	7
		Lambda cyhalothrin (2)	7
		Spinosad (3)	7
		Indoxacarb (3)	10
		Phosmet (2)	14
Chlorpyrifos-methyl (1)	21		

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Αναμένονται βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.
- Προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
- Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν την συγκομιδή μειώνει τις μετασυλεκτικές σήψεις.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αριθμός ημερών έως την συγκομιδή):
 - Bacillus subtilis strain QST 713, Fenbuconazole, Fluopyram + Tebuconazole, Iprodione, Thiophanate-methyl (3)
 - Boscalid + Pyraclostrobin, Cyprodinil, Cyprodinil + Fludioxonil, Difenoconazole, Tebuconazole, Tebuconazole + Trifloxystrobin (7)
 - Propiconazole (14)

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

(*Cydia splendana* Hübner, Lepidoptera: Tortricidae)

- Η πτήση του εντόμου συνεχίζεται με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας με μια επαναληπτική επέμβαση αυτής που είχε προταθεί στο δελτίο νο 39-30/6.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	28-31 Ιουλίου	Chlorantraniliprole (2)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	2-4 Αυγούστου	Deltamethrin (2), Lambda cyhalothrin (2)

- Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης