



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

21/27-4-16

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου και στις ορεινές περιοχές.

**Οδηγίες-
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέχρι 3 Μαΐου με: *Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ, Ντιφλουμπενζουρόν, Φενοξυκάρμπ, Χλωραντраниλιπρόλ.*

2. Από 4 μέχρι τις 7 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες *Μεθοξυφenoζάντ.*

3. Από 8 ως 12 Μάη με:

Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Από 4 μέχρι τις 7 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 8 ως 12 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

2. ΝΑΡΚΗ - ΣΕΣΙΑ

Οδηγίες: **Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Νάρκη: *Αμπαμεκτίν+Χλωραντраниλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοσάντ, Τ-φλουβαλινείτ, Φενοξυκάρμπ, Φοσμέτ, Χλωραντраниλιπρόλ.*

Σέσια: *Μπέτα συφλουθρίν.*

3. ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες:

Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη σημαντική παρουσία των ωφελιμών (πασχαλίτσες, χρύσωπες κλπ) να γίνεται επέμβαση με σκευάσματα που είναι φιλικά στα ωφέλιμα έντομα.



Φυτ/κά
Προϊόντα:

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Κλοθιανιντίν, Λάμπντα Συαλοθρίν, Πιριμικάρμπι, Σπιροτετραμάτ, Τ-φλουβαλινέιτ, Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

4.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες:

Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.

Φυτ/κά
Προϊόντα:

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν(2) , Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ(1-2), Ασεκουινασίλ(1), Ετοξαζόλ(1), Μιλμπεμεκτίν (2), Μπιφенаζέιτ (1) Σπιροντικλοφέν (1) Τεμπουφενπυράντ(1).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο αριθμός δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών. Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **Με βάση τον Καν (ΕΕ)2016/60 έγινε τροποποίηση της έγκρισης των ΦΠ με δραστική ουσία το χλωρπυριφός. Σε αχλαδιές και μηλιές απαγορεύεται η χρήση του μετά την άνθηση.**
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ