

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

(ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)



Καρπόκαψα.
Συμπτώματα στο σημείο επαφής των καρπών. Εξωτερικά διακρίνονται τα αποχωρήματα.



Καρπόκαψα.
Εσωτερικά η ρόδινη προνύμφη φτάνει μέχρι τα σπέρματα, τα οποία κατατρώει.



Πικρή κηλίδωση. Ξεκινά εσωτερικά και κάτω από την επιδερμίδα του καρπού. Στα αρχικά στάδια εξωτερικά διακρίνονται υδατώδεις κηλίδες συνήθως στην κορυφή του καρπού.



Πικρή κηλίδωση. Αργότερα οι κηλίδες εξωτερικά είναι καστανές – μαύρες, ελαφρά βυθισμένες (σαν λακάκια) και εσωτερικά φελλοποιημένες.

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής - Επάγγελος Α. Αλατοσατιανός

6.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :
(*Carpospina pomonella*)

Μηλιά - Αχλαδιά

Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών στις ορεινές - όψιμες περιοχές (οροπέδιο Λασιθίου, οροπέδιο Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα, κ.α.).

Την περίοδο αυτή και μέχρι πριν τη συγκομιδή να γίνονται επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί με μεσοδιαστήματα επέμβασης 10 - 12 ημ.

Να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα ανάλογου χρόνου αναμονής για τη συγκομιδή.

Να τηρείται αυστηρά το χρονικό διάστημα ασφαλείας από την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα.

ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ:

- Είναι μη παρασιτική ασθένεια των μήλων που οφείλεται σε διαταραχή από ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο.

Διαπιστώνεται κυρίως κατά την αποθήκευση, μπορεί όμως να εμφανιστεί και πριν τη συγκομιδή. Εντονότερα εμφανίζεται:

- σε νεαρά δένδρα, ιδιαίτερα αν έχουν μικρή καρποφορία,
- σε μεγάλο μεγέθους καρπούς,
- σε καρπούς που συγκομίζονται πρόωρα,
- σε ακανόνιστες αρδεύσεις,
- σε υπερβολική αζωτούχο λίπανση και
- σε αυστηρό κλάδεμα

Οδηγίες:

Συνιστώνται εφαρμογές εγκεκριμένων σκευασμάτων ασβεστίου. Να γίνουν 2 - 3 εφαρμογές ανά 15 - 20 ημέρες με τελευταία 2 εβδομάδες πριν την συγκομιδή. Χρόνος εφαρμογής: Νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας.

Ηράκλειο 5 Αυγούστου 2015

Η Προϊστάμενη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη