

**ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ**  
**ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436  
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663  
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

**No 29 / 26 Μαΐου 2015**

**ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

**ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ και ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ**

**(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, *Anarsia lineatella* Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)**

- Η πτήση της Ανάρσιας και του Φυλλοδέτη συνεχίζεται με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές.
- Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από τα συγκεκριμένα έντομα με μια επαναληπτική επέμβαση αυτής που είχε προταθεί στο δελτίο νο 24-13/5, στις ποικιλίες που θα συγκομιστούν 10-20 Ιουνίου.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με την ημερομηνία της προηγούμενης επέμβασης και τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού που είχε επιλεγθεί (υπολογίστε τον αριθμό ημερών για επανάληψη του φυτοπροστατευτικού).
- Ενδεικτικά, το χρονικό διάστημα επέμβασης κυμαίνεται στις **30-31 Μαΐου**.
- **Προσοχή** να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.
- Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την Ανάρσια δόθηκαν στο δελτίο νο 20-30/4 και για τον Φυλλοδέτη στο δελτίο νο 24-13/5. Με κατάλληλη επιλογή φυτοπροστατευτικού μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονη καταπολέμηση των δύο εντόμων.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**ΩΙΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ**

**(*Podosphaera leucotricha* Ell. and Ev. Salm.)**

- Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας του καρπιδίου με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.
- Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.
- Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων δόθηκαν στο δελτίο νο 27-18/5.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Νικολάου Σταυρούλα