

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Άγιος Λουκάς - Τέρμα Αμυνταίου, 65110 Καβάλα, Fax : 2510 600430, e mail : pkrfpeka@otenet.gr

Πληροφορίες : Ηλιάδου Μαρία (τηλ. 2510 600421)

Πυρηνοτρήτης (*Prays oleae*)

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου (2η γενιά) ξεκίνησε στις πρώιμες περιοχές με υψηλούς πληθυσμούς. Αναμένεται η έξοδος του εντόμου και στις όψιμες περιοχές.



Το ενήλικο του πυρηνοτρήτη έχει μήκος 6 - 6,5 και άνοιγμα πτερύγων 13 - 15 χιλιοστά.



Ψεκασμοί :

Στις πρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος 3 - 5 χιλιοστά.

Σε αυτό το στάδιο να γίνει ο πρώτος ψεκασμός ο οποίος πρέπει να επαναληφθεί μετά από περίπου 15 ημέρες ανάλογα με την υπολειμματικότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Στις όψιμες περιοχές ο πρώτος ψεκασμός να γίνει μία εβδομάδα αργότερα.

Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*)

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε ελαιοκτήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη. Εάν έγινε καταπολέμηση της παρλατόριας προανθικά με εντομοκτόνο (ρυθμιστής ανάπτυξης), δεν απαιτείται ψεκασμός.

Ακάρεα

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες και όπου δεν έγινε αποτελεσματική καταπολέμηση λόγω συνεχών βροχοπτώσεων, θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας ψεκασμός με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση των ακάρεων.

- ♦ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.minagric.gr (Γεωργικές προειδοποιήσεις).
- ♦ **Για λόγους ταχύτερης αποστολής του συνημμένου Δελτίου, αλλά και μείωσης των ταχυδρομικών εξόδων, θα παρακαλούσαμε τους αποδέκτες του Δελτίου να μας γνωστοποιήσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e mail) στην οποία θα αποσταλεί το επόμενο Δελτίο.**

Ο

Προϊστάμενος Τμήματος

Ρώμας Δημήτριος