



## No 27 / 13 Αυγούστου 2013

Υφούλης Αντώνης  
Λαΐδου Ιωάννα  
Μακρίδου Ευγενία**ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ****A. ΑΝΑΡΣΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ****(*Anarsia lineatella* Zeller - *Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)**

- Ξεκίνησε η 3<sup>η</sup> πτήση των εντόμων.
- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται αυτό το χρονικό διάστημα συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, συνιστάται επέμβαση ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

|  | ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ<br>ΠΕΡΙΟΧΕΣ  | ΟΡΕΙΝΕΣ<br>ΠΕΡΙΟΧΕΣ<br>(υψόμετρο > 250μ)                        | Εγκεκριμένες δραστικές<br>ουσίες<br>(μέγιστος αριθμός εφαρμογών<br>ανά καλλιεργητική περίοδο) | Αριθμός ημερών<br>έως την<br>συγκομιδή με<br>αύξουσα<br>ταξινόμηση |
|--|---|---|---|--|
| Εφαρμογή<br>βιολογικών<br>σκευασμάτων                                      | <b>17-19<br/>Αυγούστου</b><br>και επανάληψη<br>ανάλογα με το<br>ΦΠΠ | <b>22-24 Αυγούστου</b><br>και επανάληψη<br>ανάλογα με το<br>ΦΠΠ | Bacillus thuringiensis spp.<br>Aizawai (2), Bacillus<br>thuringiensis var. Kurstaki           | 0  |
| Φυτοπροστατευτικά<br>προϊόντα με<br>εφαρμογή κατά την<br>εναπόθεση των ωών | <b>14-16<br/>Αυγούστου</b><br>και επανάληψη<br>ανάλογα με το<br>ΦΠΠ | <b>19-21 Αυγούστου</b><br>και επανάληψη<br>ανάλογα με το<br>ΦΠΠ | Methoxyfenozide (3)   | 7  |
|  |   |   | Chlorantraniliprole (2)   | 14   |
|  |   |   | Diflubenzuron (2)   | 30   |
| Φυτοπροστατευτικά<br>προϊόντα με<br>εφαρμογή κατά την<br>εκκόλαση των ωών  | <b>17-19<br/>Αυγούστου</b><br>και επανάληψη<br>ανάλογα με το<br>ΦΠΠ | <b>22-24 Αυγούστου</b><br>και επανάληψη<br>ανάλογα με το<br>ΦΠΠ | Beta-cyfluthrin (2)   | 7  |
|  |   |   | Cyfluthrin (1)  | 7  |
|  |   |   | Deltamethrin (2)  | 7  |
|  |   |   | Emamectin (3)   | 7  |
|  |   |   | Etofenprox (2)  | 7  |
|  |   |   | Lambda cyhalothrin (2)  | 7  |
|  |   |   | Spinosad (3)  | 7  |
|  |   |   | Indoxacarb (3)  | 10   |
| Chlorpyrifos (2)   | 20  |   |   |  |
| Chlorpyrifos-methyl (1)  | 21  |   |   |  |

- **Προσοχή** να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.
- Η επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

## **B. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ**

(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, Homoptera: Diaspididae)

- Ξεκίνησε η 2<sup>η</sup> πτήση του εντόμου.
- Προσβάλλει και την ακτινιδιά.
- Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται άμεση επέμβαση με ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν (εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Fatty acid potassium salt, Fenoxycarb, Paraffin oil).
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης  
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη