



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

36/15-7-13

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις:

Η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με υψηλούς πληθυσμούς.

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στις μηλιές και αχλαδιές όλων των περιοχών με:

Φυτοπρ/κά προϊόντα:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) -**3 μέρες**,
Δελταμεθρίν -**7 μέρες**, (*Εμαμεκτίν μπενζοείτ-μόνο στη μηλιά* -**3 μέρες**), (*Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά* -**7 μέρες**), *Θιακλοπρίντ* -**14 μέρες**, *Ιντοξακάρμπ* -**10 μέρες**, *Μπέτα συφλουθρίν* -**7 μέρες**, *Σπινοσάντ* -**14 μέρες**, *Συφλουθρίν* -**7 μέρες**, *Φοσμέτ* -**28 μέρες**, *Χλωρπυριφός* -**30 μέρες**, *Χλωρπυριφός μεθύλ* -**21 μέρες**.

2. ΝΑΡΚΗ – ΣΕΣΙΑ (ΜΗΛΙΑ)

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

Φυτ/κά προϊόντα:

Νάρκη: *Αμπαμεκτίν, Θιακλοπρίντ, Λάμδα –Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Μεθοξυφenoζαίντ, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοσάντ, Συφλουθρίν, Φενοξυκάρμπ, Φοσμέτ, Χλοραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός.*
Σέσια: *Χλωρπυριφός.*

3. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ(ΑΧΛΑΔΙΑ)

Διαπιστώσεις:

Οι πληθυσμοί είναι υψηλοί και ο κίνδυνος προσβολών μεγάλος για τα αχλάδια των πρώιμων περιοχών.

Οδηγίες:

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στις αχλαδιές των πρώιμων περιοχών. Η προστασία να συνεχιστεί ως την συγκομιδή. Στις αχλαδιές των όψιμων περιοχών, η προστασία να ξεκινήσει από τις 25 Ιουλίου.

Φυτοπρ/κά προϊόντα:

Δελταμεθρίν.

4.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ (ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ)

Οδηγίες:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.



5. ΠΙΚΡΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ (ΜΗΛΙΑ)

Είναι μη παρασιτική ασθένεια που οφείλεται σε ανεπαρκή εφοδιασμό των καρπών με ασβέστιο.

Η έλλειψη ασβεστίου στους καρπούς προέρχεται από τον ανταγωνισμό κυρίως αζώτου, καλίου, μαγνησίου. Η «ασθένεια» είναι σοβαρότερη σε καρπούς νεαρών δένδρων με μικρή καρποφορία και σε μεγάλου μεγέθους καρπούς.

Οδηγίες:

Όπου υπάρχει δεδομένο εμφάνισης της «ασθένειας» από την προηγούμενη χρονιά, να γίνει ψεκασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα ασβεστίου με προσθήκη διαβρεκτικού.

Να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 15 ημέρες.

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων για την αποφυγή δημιουργίας εγκαυμάτων στους καρπούς.

Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών αυξάνεται, αν συγχρόνως αποφεύγονται συνθήκες που αυξάνουν την ευπάθεια των καρπών, όπως, ακανόνιστα ποτίσματα, απότομη έκπτυξη ζωηρής βλάστησης, πλούσια αζωτούχος και καλιούχος λίπανση και συγκομιδή καρπών σε πολύ πρόωρο στάδιο ωρίμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1. ΠΡΟΣΟΧΗ στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις αχλαδιές.**
- 2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- 3. Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ