



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα)
Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707
Fax: 26510 41902



ΑΜΠΕΛΙ



1

2

3

4

5

6

7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

7. 05 / 8 /2013

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η πτήση της τρίτης γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των συλλήψεων στο δίκτυο παγίδων είναι σημαντικά υψηλότερος από τις περασμένες χρονιές.

Ένας ψεκασμός είναι δικαιολογημένος με την λήψη του δελτίου, ΜΟΝΟ σε αμπελώνες που κατά την προηγούμενη γενιά (τ. Ιουνίου-αρ. Ιουλίου) βρέθηκαν στα σταφύλια αρκετές φωλιές διατροφής (περισσότερες από 10 ζημιές-φαγώματα στα 100 τσαμπιά).



Phytoma.com /image gallery

Κατάλληλα φάρμακα: βλέπε λίστα που σας έχει σταλεί.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Στο στάδιο του «γυαλίσματος» (περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων) να γίνει ψεκασμός και ενδεχομένως συνδυασμός με την καταπολέμηση της ευδεμίδας, με ειδικό βοτρυδιοκτόνο σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα κ.α.). Η επέμβαση μπορεί να αφορά μόνο την ζώνη των σταφυλιών. Σε περιοχές που το σάπισμα παρουσιάζετε κάθε χρόνο (υγρά, ζωηρά, υπερπαραγωγικά αμπέλια), να γίνει επανάληψη του ψεκασμού κατά την ωρίμανση. Το ξεφύλλισμα βοηθάει στην αντιμετώπιση της ασθένειας καθώς επιτρέπει τον καλύτερο αερισμό των σταφυλιών.

Κατάλληλα φάρμακα: Ιπροντιόν (21 ημέρες), Φλουζινάμ (21 ημέρες), Μεπανιπυρίμ (21 ημέρες), Μποσκαλίντ (28 ημέρες), Φλουντιοξονίλ+Συπροντινίλ (21 ημέρες), Φενεξαμίντ (14 ημέρες), κ.α. (Διάφορα σκευάσματα.) Τα χαλκούχα σκευάσματα (21 ημέρες) βοηθούν στην αντιμετώπιση του Βοτρυτή καθώς «σκληραίνουν» την ράγα.

ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Η σήψη αρχίζει από πληγή της ράγας κι επεκτείνεται γρήγορα στο υπόλοιπο μέρος του σταφυλιού. Χαρακτηριστικό της σήψης είναι η **οσμή** ξυδιού που αναδίδεται από τα προσβεβλημένα τμήματα. **Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη της Ώξινης Σήψης στον αμπελώνα ενδείκνυται η διενέργεια ψεκασμού με εντομοκτόνο (δελταμεθρίν, υπερμεθρίν 7 ημέρες κ.α.) για καταπολέμηση των εντόμων φορέων της ασθένειας, μαζί με την προσθήκη ενός χαλκούχου σκευάσματος (21 μέρες).**

ΩΙΔΙΟ

Μετά από το στάδιο του γυαλίσματος οι ρώγες δεν προσβάλλονται από την ασθένεια. Όμως τα φύλλα οι βλαστοί και οι βόστρυχοι εξακολουθούν να είναι ευαίσθητοι. **Να συνεχιστεί η προστασία σε αμπέλια με διαπιστωμένες προσβολές.**

Κατάλληλα φάρμακα βλ. λίστα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάσετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτήν.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**ΣΙΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**

Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο:

(<http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings/>).