

Δραστικές ουσίες (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της πατάτας

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ	Α Λ Τ Ε Ρ Ν Α Ρ Ι Α	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
ΑΜΕΤΟΚΤΡΑΝΤΙΝ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	+		3	7
ΘΕΙΟ + ΧΑΛΚΟΣ (με επίπαση)	+		2	21
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+	+	4 ή 8 (ανάλογα το σκεύασμα)	7
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΖΟΞΑΜΙΝΤ	+		3	7
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ	+		3	28
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ-Μ	+		3	28
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ	+		3	7
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ-Μ	+		3	14
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	+		3	7
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	+		4	14
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ	+		4	21
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ	+		4	14
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ	+		4	7
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΧΑΛΚΟΣ	+	+	2	21
ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ	+		6	3
ΜΕΤΙΡΑΜ	+		3	14
ΜΕΤΙΡΑΜ + ΑΜΕΤΟΚΤΡΑΝΤΙΝ	+		3	7
ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	+		3	3
ΠΡΟΜΑΜΟΚΑΡΜΠ	+		3	15
ΠΡΟΜΑΜΟΚΑΡΜΠ + ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ	+		6	14
ΠΡΟΠΑΜΟΚΑΡΜΠ + ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ	+		4	7
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ	+	+	4	14
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ + ΠΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	+	+	3	14
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ + ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ	+		8	14
ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ	+		6 ή 10 (ανάλογα το σκεύασμα)	7
ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ + ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ - Μ	+		3	14
ΦΟΛΠΕΤ	+	+	3	21
ΦΟΛΠΕΤ + ΧΑΛΚΟΣ	+		2	21
ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ	+		3	3
ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	+		3	21

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Ε Π Ο Ρ Ο Σ	Α Λ Τ Ε Ρ Ν Α Ρ Ι Α	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
ΧΑΛΚΟΣ (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ)	+		6	21
ΧΑΛΚΟΣ (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ)	+		2	21
ΧΑΛΚΟΣ (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ)	+		3	21
ΧΑΛΚΟΣ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ)	+		4	21
ΧΑΛΚΟΣ + ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	+		3	7
ΧΑΛΚΟΣ + ΜΑΝΕΜΠ	+		6	21
ΧΑΛΚΟΣ + ΜΑΝΕΜΠ + ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ	+	+	6	21
ΧΑΛΚΟΣ + ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ	+		2	28
ΧΑΛΚΟΣ + ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ-Μ	+		3	21
ΧΑΛΚΟΣ + ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ	+		2	28
ΧΑΛΚΟΣ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	+		2	21
ΧΑΛΚΟΣ + ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ	+		2 ή 4 (ανάλογα το σκεύασμα)	21
ΧΛΩΡΟΘΑΛΟΝΙΑ + ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ-Μ	+		2	14
ΧΛΩΡΟΘΑΛΟΝΙΑ + ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ	+	+	2	30

**ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ F.R.A.C. (FUNGICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE)**

**Πίνακας ομαδοποίησης εγκεκριμένων δραστικών για τον περονόσπορο της πατάτας**

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ	ΟΜΑΔΑ
ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ, ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ.	1η
ΑΜΕΤΟΚΤΡΑΝΤΙΝ	2η
ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ, ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ- Μ, ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ.	3η
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ	4η
ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ, ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ, ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ, ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ.	5η
ΠΡΟΠΑΜΟΚΑΡΜΠ	6η
ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ	7η
ΦΟΖΕΤΥΛ - ΑΛ	8η
ΖΟΞΑΜΙΝΤ	9η
ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ	10η
Επαφής - Ευρέως φάσματος (ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ, ΜΕΤΙΡΑΜ, ΦΟΛΠΕΤ, ΧΛΩΡΟΘΑΛΟΝΙΑ, ΧΑΛΚΟΣ). Τα ευρέως φάσματος παρουσιάζουν το μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ τους και με τις άλλες ομάδες σε πρόγραμμα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και διαχείρισης ανθεκτικότητας.	11η

Για την αποφυγή της ανθεκτικότητας των παθογόνων στα φάρμακα θα πρέπει στους ψεκασμούς να μη χρησιμοποιούνται συνεχόμενα δραστικές από την ίδια ομάδα αλλά να εναλλάσσονται με άλλη ομάδα. Μην ξεπερνάτε τον μέγιστο αριθμό επεμβάσεων ανά περίοδο και τηρείτε τα μεσοδιαστήματα εφαρμογών.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, δεν αντικαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση διαβάστε σχολαστικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα συσκευασίας.

Ηράκλειο, Ιούνιος 2014