

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
**ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ**
Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη 38334
Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 66525
Fax : 24210 69545
e- mail: fyto12@otenet.gr
Πληροφορίες : Msc Ι. Παππά,
Δρ. Θ. Μόσχος

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
- βλάπτει την υγεία των
καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 7 / 31 -7 -2013

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΑΡΠΩΝ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)



Εικόνα 1: Καρποί ροδακινιάς και δαμασκηνιάς προσβεβλημένοι από μονίλια

Ο υγρός και σχετικά δροσερός για την εποχή καιρός ευνοεί την ανάπτυξη της ασθένειας. Οι καρποί γίνονται πιο ευπαθείς καθώς πλησιάζουν στην ωρίμανση και μπορεί να εμφανίσουν την ασθένεια ακόμη και μετασυλλεκτικά.

Η πρώτη ένδειξη μόλυνσεως στον καρπό είναι η εμφάνιση μιας καστανής κυκλικής κηλίδας η οποία εξαπλώνεται. Καθώς η προσβολή προχωράει στην επιφάνεια του καρπού εμφανίζονται κατά θέσεις οι καρποφορίες του μύκητα υπό μορφή εξανθήσεων. Στους ώριμους καρπούς η προσβολή εξελίσσεται σε υγρή σήψη.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη προσβολές στον οπωρώνα και ο καιρός συνεχίσει να είναι υγρός και σχετικά δροσερός, συστήνεται να γίνει ψεκασμός των δένδρων για την προστασία των καρπών με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης μυκητοκτόνο.

Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγονται οι τραυματισμοί των ώριμων καρπών κατά την συλλογή και την συσκευασία τους.

Για την επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο χρόνος μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: boscalid, pyraclostrobin, iprodione, tebuconazole, thiophanate-methyl, cyprodinil, fludioxonil, fenbuconazole

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ : boscalid, pyraclostrobin,, thiophanate- methyl, fludioxonil

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Βερικοκιά, Ροδακινιά -Αχλαδιά)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΑΣ – ΛΕΧΩΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ - ΚΟΡΟΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Συστήνεται να συνεχιστεί η προστασία των καρπών που βρίσκονται στην έναρξη της ωρίμανσης με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και κατάλληλο για το στάδιο ανάπτυξης εντομοκτόνο όπως αναφέρεται στο ΔΓΠ Νο 6 / 3-7-2013

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Οι συλλήψεις του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων παραμένουν υψηλές. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης εντομοκτόνο. **Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: deltamethrin

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

Λύκας Δημήτρης