


ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 16 / 20 Απριλίου 2015

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ

A. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

(Venturia inaequalis Cooke Wint. *Venturia pirina* Aderhold)

- Οι βροχοπτώσεις δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για τη μόλυνση. Συνιστάται η προστασία των δένδρων με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα, στο 70 – 90% της «πτώσης των πετάλων».



B. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

(Erwinia amylovora Burrill Winslow et al.)

- Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν βροχοπτώσεις και αναμένονται ξανά μέσα στην εβδομάδα. Επίσης, στις περισσότερες περιοχές η μέση θερμοκρασία ξεπερνάει τους 18°C. Όσες ποικιλίες βρίσκονται στην **άνθηση**, συνιστάται η προστασία των ανοιγμένων λουλουδιών.

Γ. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)

- Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε τη μέθοδο παρεμπόδισης συνεύρεσης των δύο φύλων (mating disruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει άμεσα με την παραλαβή του Δελτίου.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

(Panonychus ulmi Koch, Acari: Tetranychidae)

- Μετά την άνθηση το άκαρι μετακινείται στα φύλλα, όπου τρέφεται και ωστοκεί.
- Συνιστάται εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων / δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα.
- Εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 20 ακάρεα / φύλλο να γίνει επέμβαση μετά την πτώση των πετάλων με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα σκευάσματα.



ΜΟΝΙΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

(*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στην πτώση πετάλων. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με ευνοϊκές θερμοκρασίες για την εκδήλωση της ασθένειας.
- Στους οπωρώνες που δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση πρέπει να γίνει στην πτώση πετάλων.



ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

A. ΜΟΝΙΛΙΑ (*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Στις **ορεινές** περιοχές οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στην άνθηση έως πτώση πετάλων, στάδια ευαίσθητα μολύνσεων. Οι συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιοχές ευνοούν τις μολύνσεις.
- Στους οπωρώνες που δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα.



B. ΦΥΛΛΟΒΙΟΣ – ΠΕΡΙΤΕΛΟΣ (ΚΛΕΟΝΟΣ)

- Μικρά κολεόπτερα που προσβάλλουν τα άνθη και τους νεαρούς καρπούς της νεκταρινιάς και από τους παραγωγούς αναφέρονται ως «κλεονός».
- Μετά την πτώση των πετάλων τα έντομα αναρριχώνται από τον κορμό των δένδρων. Η άνοδος του «κλεονού» στα δένδρα αναμένεται μαζική.
- Στους οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές συνιστάται η δημιουργία ζωνών σε κάθε δένδρο με εντομολογική κόλλα ή με κολλητικές ταινίες διπλής όψης.
- Στους οπωρώνες που παρατηρούνται έντονες προσβολές και αν το παραπάνω μέτρο είναι ανεπαρκές, συνιστάται επέμβαση με εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Νικολάου Σταυρούλα