



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

17 / 19-4-16

### ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ- ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

#### 1. ΑΝΑΡΣΙΑ- ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ

**Διαπιστώσεις:** Ξεκίνησε η πρώτη πτήση σε όλες τις περιοχές. Οι συλλήψεις κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα.

**Οδηγίες:** Στους οπωρώνες των παραπάνω πυρηνοκάρπων, των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 24 ως 28 Απριλη. Στις όψιμες περιοχές η επέμβαση να γίνει από 2 ως 6 Μάη.

**Φυτ/κά προϊόντα:** **Βερικοκιά:** Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ 7 μέρες } , {Ιντοξακάρμπ 10 μέρες } , {Θιαμεθοξάμ+Χλοραντρανιλιπρόλ, Χλοραντρανιλιπρόλ 14 μέρες}.

**Ροδακινιά:** Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Λάμντα Συαλοθρίν Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ 7 μέρες } , {Ιντοξακάρμπ 10 μέρες } , {Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ + Χλοραντρανιλιπρόλ, Φοσμέτ, Χλοραντρανιλιπρόλ 14 μέρες } , {Χλωρπυριφός μεθύλ 21 μέρες} , {Ντιφλουμπενζουρόν 30 μέρες }.

**Νεκταρινιά:** Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ +Χλοραντρανιλιπρόλ, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Φοσμέτ, Χλοραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός μεθύλ.

**Δαμασκηνιά:** Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Χλοραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός.

**Αν επιλεγεί κάποια από τις δραστικές ουσίες Βάκιλλος Θουριγγίας , Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ +Χλοραντρανιλιπρόλ, Ντιφλουμπενζουρόν, Χλοραντρανιλιπρόλ η επέμβαση να γίνει άμεσα.**

### ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

#### 1. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

**Διαπιστώσεις:** Οι προσβολές από το κοκκοειδές είναι σποραδικές. Από δειγματοληψίες διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των νεαρών ερπυσιών.

**Οδηγίες:** **Να γίνει καταπολέμηση στις ίδιες ημερομηνίες με την ανάρσια. Απαιτείται επιμελημένος ψεκασμός, με διαβροχή κορμών και βραχιόνων.**

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Ροδακινιά:** *Θερινά λάδια, Άλατα λιπαρών οξέων, { Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός μεθύλ 21 μέρες }, { Φενοξικάρμπι, 20 μέρες }.*

**Νεκταρινιά:** *Θερινά λάδια, Άλατα λιπαρών οξέων, { Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός μεθύλ 21 μέρες }.*

**Δαμασκηνιά:** *Θερινά λάδια, { Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ 21 μέρες }, { Χλωρπυριφός, 20 μέρες }.*

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Οι μέρες που αναγράφονται δίπλα στις δραστικές ουσίες, είναι οι μέρες που μεσολαβούν από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί σε υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)).

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**