

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ & ΞΑΝΘΗΣ



Ακραία ευδεμίδας

Προνύμφη ευδεμίδας

Βοτρυτής

Ωίδιο

Ταχ. Δίψη:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ. : 2510800421

Φακ: 2510800430

Πληροφορίες: Κ. Λίλης-Δ.Πουργιώτη-
Μ. Ηλιάδου- Γ. Βενέτη
Τηλ:2510-600421-422-420-425

Αρ. Δελτίου:11/02-09-14

ΑΜΠΕΛΙ

Ι. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Ξεκίνησε η δ'πτήση του εντόμου της ευδεμίδας. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως υψηλός. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος προσβολής των σταφυλιών και εμφάνισης δευτερογενών προσβολών όπως βοτρυτής,όξινη σήψη κ.α. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις όψιμες ποικιλίες.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:

- **04 -05 Σεπτεμβρίου** στις πρώιμες περιοχές και περιοχές Αμπέλων, Τριανταφυλλιάς του Ν. Σερρών
- **05 -06 Σεπτεμβρίου** στις μεσοπρώιμες περιοχές και περιοχές του Ν. Ξάνθης
- **07 -08 Σεπτεμβρίου** στις όψιμες περιοχές

Επανάληψη μετά από **7 - 8 ημέρες**, λαμβάνοντας υπόψη την υπολειμματική διάρκεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μικρής υπολειμματικής διάρκειας για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Σε σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο ωρίμανσης να προτιμηθούν σκευάσματα του βάκιλλου θουριγγίας.

Συστηλ χρήση
φυτοφαρμάκων
σημαίνει



καλύτερη

φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν



II.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας.Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια υγρών περιοχών,όψιμων ποικιλιών και όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο κατά το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.

III. ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Εμφανίζεται από το ξεκίνημα της ωρίμανσης των σταφυλιών και εκτείνεται κατά την πλήρη ωρίμανση. Παρατηρείται κυρίως σε αμπέλια όπου δεν έγινε σωστή αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Οφείλεται σε βακτήρια και ζακχαρομύκητες. Μεταδίδεται με το έντομο δροσόφιλα(μύγα του ξυδιού).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σωστή καταπολέμηση της ευδεμίδας, του ωιδίου και αποφυγή πληγών στα σταφύλια. Θα πρέπει επίσης να γίνεται καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο σε συνδυασμό με μια πυρεθρίνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1.Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.
2. Να χρησιμοποιηθούν γ. φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
Σταφύλια έτοιμα προς συγκομιδή δεν ψεκάζονται
3. Όλοι οι παραπάνω ψεκασμοί να γίνουν **μόνο** εφόσον λάβουμε υπόψη την **υπολειμματική διάρκεια** των γεωργικών φαρμάκων και το **στάδιο ωρίμανσης** των σταφυλιών και
4. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η

Προισταμένη Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή