



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

10/23-03-15

ΑΜΠΕΛΙ

Βλαστικά στάδια




Β

Φούσκωμα ματιού



Γ

Πράσινη Κορυφή



Δ

Έξοδος Φύλλων



Ε

Πρώτα Φύλλα

1.ΦΟΜΟΨΗ

Από τον μύκητα προσβάλλονται κυρίως οι βλαστοί, οι κληματίδες και οι βραχίονες αλλά και τα φύλλα, οι μίσχοι και τα σταφύλια. Οι προσβεβλημένες κληματίδες έχουν χρώμα λευκό προς το γκρί και φέρουν μαύρα στίγματα, τις καρποφορίες του μύκητα.

Οδηγίες: Για τον καλύτερο έλεγχο της ασθένειας και την ελαχιστοποίηση των μολύνσεων, συνιστώνται δύο διαδοχικές ανοιξιάτικες επεμβάσεις. Η πρώτη όταν το 30 - 40% των ματιών βρίσκεται στο στάδιο Δ. Η δεύτερη μετά από μια εβδομάδα (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), όταν δηλαδή τα υπόλοιπα μάτια φτάσουν στο ίδιο στάδιο.

Φυτ/κά προϊόντα: *Μανέμπ* (μόνο στα οινοποιήσιμα), *Μανκοζέμπ*, *Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ*, *Φλουοπικολίντ+Προπινέμπ*, *Φολπέτ*, *Φολπέτ+Μεταλαξύλ*, *Φολπέτ+Φοσετύλ-Αλ*.

2.ΑΚΑΡΕΑ

Τα ακάρεα κάνουν εμφανή την παρουσία τους με την έναρξη της βλάστησης και προκαλούν χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Οδηγίες: Δεν προκαλούν συνήθως ζημιές που να δικαιολογούν επέμβαση.
Φυτ/κά προϊόντα: Στα αμπέλια που κρίνεται ότι η επέμβαση είναι αναγκαία, αυτή να γίνει με: *Άλατα λιπαρών οξέων*, *Θείο*, *Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός στην έκπτυξη ή* στα τρία πρώτα φύλλα με *Αμπαμεκτίν*.

3.ΘΡΙΠΕΣ

Οδηγίες: Σε αμπελώνες που διαπιστωθούν θρίπες (χτυπώντας βλαστούς πάνω σε λευκή επιφάνεια στο στάδιο Δ) , να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά προϊόντα: *Άλατα (Κ) λιπαρών οξέων*

Σημειώσεις:

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & α.α
Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**

