



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

19/ 30-4-15

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η πρώτη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

**Οδηγίες
Φυτ/κά
προϊόντα:**

**Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε
επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:**

1.Μέχρι 3 Μαΐου με: *Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ,Φενοξυκάρμπ,
Χλοραντρανιλιπρόλ.*

2. Από 4 μέχρι τις 8 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Μεθοξυφenoζάντ, Ντιφλουμπενζουρόν.*

3.Από 9 ως 13 Μάη με:

*Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα
συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός,
Χλωλπυριφός μεθύλ.*

**Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε
να επέμβετε ως εξής:**

1. Από 4 μέχρι τις 8 Μάη με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2.Από 9 ως 13 Μάη με:

Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωλπυριφός μεθύλ.

**Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών να μην γίνει
επέμβαση για την καρπόκαψα. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο
δελτίο.**

2.ΨΥΛΛΑ

Διαπιστώσεις: Την περσινή χρονιά υπήρχαν σοβαρά προβλήματα από το έντομο. Στις δειγματοληψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη νυμφών N5, λίγες νέες εναποθέσεις αυγών και ακμαία.

Οδηγίες: **Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Καλό είναι να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα και με ωοκτόνο δράση.**

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για την σωστή αντιμετώπιση του εντόμου να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική ουσία. Η χρήση θερινού πολτού συνεργιστικά σε δραστικές ουσίες που επιτρέπεται, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.



**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ακριναθρίν, Αμπαμεκτίν (δρά και σε ηλικιωμένες νύμφες N5), Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (δρά σε αυγά και νύμφες), Ιμιντακλοπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν (δρά σε αυγά και νύμφες), Σπινοςάντ, Σπιροτετραμάτ (δρα σε νύμφες), Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Φενοξυκάρμπ (δρά σε αυγά και νύμφες), Χλωλπυριφός μεθύλ.

ΑΧΛΑΔΙΑ - ΜΗΛΙΑ

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις: Οι προσβολές είναι σποραδικές.

Οδηγίες: Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Σε οπωρώνες που δεν υπάρχουν προσβολές να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με προστατευτική δράση.

**Φυτ/κά
προϊόντα:** Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες: Να γίνονται συχνότατα επιτόπιοι έλεγχοι. Όταν διαπιστώνετε πρόβλημα να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΜΗΛΙΑ

Οδηγίες: Η έναρξη της πτήσης αναμένεται τις επόμενες ημέρες. **Να μην γίνει επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ