


# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα) Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα  
Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707. Fax: 26510 41902



# ΕΛΙΑ



1

2

3

4

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Καμπλέτσας, Κ. Βάντζιος

2. 08/05/2015

### ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Βλαστικό στάδιο: Οι πρωϊμότερες ποικιλίες στις πιο πρώιμες περιοχές μόλις ξεκίνησαν να εισέρχονται στο βλαστικό στάδιο του κροκιάσματος..

Οι συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων της ανθόβιας γενιάς του εντόμου παρουσιάζονται αυξημένες στις περισσότερες περιοχές.

Καταπολέμηση: Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καμία επέμβαση. Σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία η επέμβαση κρίνεται αναγκαία μόνον όταν ο πληθυσμός των προνυμφών του εντόμου είναι μεγάλος (πάνω από 20% των ανθοταξιών προσβεβλημένες). Στην τελευταία περίπτωση ο ψεκάσμος να εφαρμόζεται στο κρόκιασμα – αρχές άνθησης όταν έχει ανοίξει το 5%-25% των μπουμπουκιών.

Κατάλληλα φάρμακα: Βάκιλλος Θουριγγίας, Δελταμέθριν, Λάμδα Συαλοθρίν, Μπέτα Σιφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Πυρεθρίνες, Χλωπυρίφως-μεθύλ.

Συνιστάται να προτιμηθεί κάποιο σκεύασμα του Βάκιλλου της Θουριγγίας γιατί είναι βιολογικό φάρμακο που δεν βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα που παρουσιάζουν υψηλούς πληθυσμούς αυτή την εποχή.

## **ΨΥΛΛΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)**

Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καμία επέμβαση. Σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία απαιτείται καταπολέμηση **μόνον όταν ο πληθυσμός των εντόμων είναι υψηλός**. Θα πρέπει τότε να γίνει ένας ψεκασμός σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του Πυρρηνοτρήτη στο κρόκισμα – αρχές άνθησης όταν έχει ανοίξει το 5%-25% των μπουμπουκιών.

**Κατάλληλα φάρμακα:** Δελταμέθριν, Παραφινικό λάδι.

## **ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ**

Η προνύμφη του εντόμου προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση (φύλλα, μίσχους, βλαστούς), καθώς και τα κλειστά άνθη. Οι νεαρές προνύμφες την άνοιξη κατατρώγουν το εσωτερικό και την κάτω επιδερμίδα των φύλλων, ενώ αφήνουν άθικτη την πάνω επιδερμίδα. Σε έντονες προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση. Την περασμένη χρονιά παρουσιάστηκαν τοπικά μόνο σημαντικά προβλήματα, γι' αυτό οι ελαιοπαραγωγοί ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προλάβουν τυχόν νέες προσβολές.

### **Καταπολέμηση:**

**1<sup>ος</sup> τρόπος:** Όταν παρουσιαστεί η πρώτη προσβολή πρέπει να γίνει ψεκασμός του φυλλώματος των δένδρων εναντίον των πρώτων τέλειων εντόμων της άνοιξης και επανάληψη μετά 15 ημέρες με το εντομοκτόνο *Θιαμεθοξάμ + Λάμδα Συαλοθρίν* φροντίζοντας να λούζονται και οι λαίμαργοι βλαστοί στη βάση του δένδρου. **Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε μετά την περίοδο ανθοφορίας.**

**2<sup>ος</sup> τρόπος:** Ψεκασμός με το εντομοκτόνο *Δελταμέθριν(2,5%β/ο)* μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα (επιτρέπεται μία μόνον εφαρμογή με αυτό το φάρμακο ανά καλλιεργητική περίοδο).

Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δένδρα, τα φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεμένα δένδρα, καθώς και τα δένδρα που πέρυσι υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το έντομο.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος  
του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Νικόλαος Μέτσιος  
Γεωπόνος