

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον


ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Ευδεμίδα. Τέλειο έντομο.
Πεταλούδα περίπου 1εκ.



Ευδεμίδα. Προνύμφη
πολύ ευκίνητη, μέχρι 1εκ.
μήκος.



Ευδεμίδα. Αυγά σε νεαρές ράγες (αριστερά) ευδιάκριτα με γυμνό μάτι (μέγεθος κεφαλής καρφίτσας), και αυγά σε μεγέθυνση (στο κέντρο πρώτης μέρας πρόσφατα τοποθετημένο και δεξιά έτοιμο να εκκολαφθεί – ορατή η κουλουριασμένη προνύμφη με καστανό κεφάλι).



Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα



Ωίδιο. Σε νεαρές ράγες



Τζιτζικάκι. Ενήλικο (περωτό) έντομο. Είναι τα μεταναστευτικά άτομα του είδους.



Τζιτζικάκι. Προνύμφη του εντόμου. Δεν πετά, είναι στην κάτω πλευρά του φύλλου, βαδίζει με πλάγια κίνηση.



Τζιτζικάκι. Καρούλιασμα και μεταχρωματισμός σε φύλλα σουλτανί. Στις ερυθρές ποικιλίες ο μεταχρωματισμός είναι κοκκινωπός.

16.

Πληροφορίες : Ν. Μπαγκής. **Παρατηρήσεις υπαίθρου:** Ρ. Οικονομάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μπαγκής

Σε όλες τις περιοχές βλαστικό στάδιο στην ποικιλία σουλτανίνα: ράγες σε ανάπτυξη.

<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ : (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες για επιτραπέζια:</p> <p>Οδηγίες για οινάμπελα, σουλτανίνα:</p> <p>Συστάσεις:</p>	<p>- Στην πρόιμη ζώνη η γενιά του εντόμου βρίσκεται στο τέλος της, λίγο μετά το μέσο στην μεσοπρόιμη και στο πρώτο μισό στην όψιμη ζώνη.</p> <p>-Στις πρόιμες περιοχές οι ωτοκίες σταδιακά μειώνονται, στις μεσοπρόιμες εμφανίζονται σταθερές και στις όψιμες πυκνώνουν.</p> <p>- Ενδεικτικές παρατηρήσεις ζωντανών αυγών σε αμπέλια στις 6 Ιουνίου*: (πρόιμη ζώνη 28 αυγά, μεσοπρόιμη ζώνη 33 αυγά και όψιμη ζώνη 44 αυγά ανά 100 σταφύλια) *Οι παρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και περιγράφουν την γενική τάση των πληθυσμών του εντόμου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.</p> <p>Στα επιτραπέζια σταφύλια συνιστάται <u>επαναληπτικός ψεκασμός</u> σε όλες τις περιοχές στις παρακάτω ημερομηνίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρόιμες - παραλιακές περιοχές: 8 - 9 Ιουνίου • Ενδιάμεση ζώνη - Κάτω Μεσσαρά: 9 - 10 Ιουνίου • Μεσοπρόιμες περιοχές: 11 - 12 Ιουνίου • Όψιμες περιοχές: 11 - 12 Ιουνίου <p>Στα οينوποιήσιμα και στη σουλτανίνα να γίνει <u>επαναληπτικός ψεκασμός</u> μόνο στις όψιμες περιοχές το διάστημα: 13 - 14 Ιουνίου.</p> <p>Σημείωση: Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p>	<p>Να συνεχιστεί η προστασία με προληπτική εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την ορθή διαχείριση τυχόν ανθεκτικότητας.</p>
<p>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ: (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Σε αμπέλια που εντοπίζονται <u>προνύμφες</u> (άπτερα άτομα) στην κάτω πλευρά των φύλλων μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.</p>
<p>ΑΚΑΡΕΑ: (<i>Eriophyes vitis</i>)</p>	<p>Παρατηρούνται αποικίες σε νεαρά φύλλα. Όπου εντοπίζονται μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με το ωίδιο.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 7 Ιουνίου 2016
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμος Ευφροσύνη