

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 40 / 21 Ιουλίου 2015

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΑΡΣΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Anarsia lineatella* Zeller - *Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Ξεκίνησε η 2^η πτήση του Φυλλοδέτη. Η πτήση της Ανάρσιας συνεχίζεται με σημαντικές συλλήψεις.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων	24-26 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2), Bacillus thuringiensis var. Kurstaki	0
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	22-23 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Methoxyfenozide (3)	7
		Chlorantraniliprole (2)	14
		Chlorantraniliprole + Thiamethoxam (1-2)	14
		Diflubenzuron (2)	30
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	24-26 Ιουλίου και επανάληψη ανάλογα με το ΦΠΠ	Beta-cyfluthrin (2)	7
		Deltamethrin (2)	7
		Emamectin (3)	7
		Etofenprox (2)	7
		Lambda cyhalothrin (2)	7
		Spinosad (3)	7
		Indoxacarb (3)	10
		Phosmet (2)	14
		Chlorpyrifos (2)	20
Chlorpyrifos-methyl (1)	21		

- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται μέχρι τέλος του μήνα δεν απαιτείται επέμβαση.
- Η επέμβαση καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Βλαστορύκτη (Καρπόκαψα ροδακινιάς) (*Grapholitha molesta* Busck, Lepidoptera: Tortricidae).

BΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, Homoptera: Diaspididae)

- Η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Οι επεμβάσεις για Φυλλοδέτη και Ανάρσια θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό και την βαμβακάδα, ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό που θα επιλεγεί.
- Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σοβαρές προσβολές συνιστάται ξεχωριστή καταπολέμηση.
- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται αυτό το χρονικό διάστημα συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση.

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Αναμένονται βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων.
- Προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
- Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν την συγκομιδή μειώνει τις μετασυλεκτικές σήψεις.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αριθμός ημερών έως την συγκομιδή):
 - Bacillus subtilis strain QST 713, Fluopyram, Thiophanate-methyl (3)
 - Boscalid + Pyraclostrobin, Cyprodinil, Cyprodinil + Fludioxonil, Difenconazole, Tebuconazole (7)
 - Propiconazole (14)

**Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από τις επεμβάσεις έως την συγκομιδή.
Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.**

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Νικολάου Σταυρούλα