

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

### ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436  
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663  
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

**№ 48 / 1 Σεπτεμβρίου 2016**

## ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

### **ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ**

(*Cydia splendana* Hübner, Lepidoptera: Tortricidae)

- Η πτήση της Καρπόκαψας συνεχίζεται.
- Συνιστάται η άμεση επέμβαση με ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο:

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή με αύξουσα ταξινόμηση
Lambda cyhalothrin	2	14
Chlorantraniliprole	2	21
Deltamethrin	2	30

- Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.
- Συνιστάται η συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων κάστανων που πέφτουν πρόωρα και όσων διαχωρίζονται ως προσβεβλημένα κατά την συγκομιδή.

### **ΒΑΛΑΝΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ**










(*Curculio elephas* (Gyllenhal) *Balaninus elephas*, Coleoptera: Curculionidae)

- Σε ορισμένες περιοχές προκαλεί ζημιές. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου (τίναγμα των δέντρων ή χρήση κολλητικής ταινίας διπλής όψης στους κορμούς) ή υπάρχει ιστορικό σημαντικής προσβολής και ζημίας.
- Εγκεκριμένη δραστική ουσία φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Chlorantraniliprole.
- Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με την Καρπόκαψα.

**Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από τις επεμβάσεις έως την συγκομιδή.**

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης

	Καρπόκαψα	Βαλάνινος
Ενήλικο		
Προσβολή	 	
Ζημία	 	 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η προνύμφη του Βαλάνινου είναι άποδη, σε αντίθεση με αυτή της Καρπόκαψας.</li> <li>• Τα κοκκώδη αποχωρήματα της προνύμφης της Καρπόκαψας συσσωρεύονται στη στοά πίσω της μέσα στο κάστανο.</li> <li>• Υπάρχει περίπτωση να συνυπάρχουν στο ίδιο κάστανο μια προνύμφη Καρπόκαψας και μία ή δύο του Βαλάνινου.</li> </ul>	