

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkrfhgr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ – ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)



Φουζικλάδιο. Προσβολή σε καρπό (δερματώδης βούλα).



Βακτηριακό κάψιμο. Έλκος σε κλαδίσκο. Το βακτήριο διαχειμάζει στα έλκη.



Σέξια. Προνύμφη και αποχωρήματα κάτω από το φλοιό βραχίονα μηλιάς.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Εράγγελος Α. Αλατσατιανός

7.

<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Fusicladium dendriticum</i>) (<i>Fusicladium pyrinum</i>) (Μηλιά - Αχλαδιά) Οδηγίες:</p>	<p>Η ασθένεια εκδηλώθηκε φέτος σε αχλαδιές και μηλιές του οροπεδίου Λασιθίου. Όπου εκδηλώθηκαν σοβαρές προσβολές συστήνεται αμέσως μετά τη φυλλόπτωση ψεκασμός των πεσμένων φύλλων με διάλυμα ουρίας 5% ή παράχωμα τους στο έδαφος. <u>Παρατήρηση</u> Το παραπάνω μέτρο είναι πιο αποτελεσματικό στις μηλιές όταν εφαρμόζεται από όλους στην ίδια περιοχή. Στις αχλαδιές το μόλυσμα παραμένει εκτός από τα πεσμένα φύλλα και πάνω στους προσβεβλημένους βλαστούς του δέντρου. Για το λόγο αυτό κατά το χειμερινό κλάδεμα οι βλαστοί που εμφανίζουν την ασθένεια να αφαιρούνται και να καίγονται.</p>
<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (<i>Erwinia amylovora</i>) (Αχλαδιά)</p>	<p>Ελάχιστες προσβολές εκδηλώθηκαν τη φετινή περίοδο στις αχλαδιές. Για την αντιμετώπιση του συνιστάται:</p> <ul style="list-style-type: none">• Επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα στη μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση κατά τη φυλλόπτωση.• Κατά το κλάδεμα να αφαιρούνται τα ξερά κλαδιά μαζί με τμήμα υγιούς ξύλου μήκους τουλάχιστον 20 εκ. και να καίγονται. Οι εργασίες κλαδέματος να γίνονται με ξηρό καιρό, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με οινόπνευμα του εμπορίου και οι μεγάλες τομές να επαλείφονται με απολυμαντικό πληγών.• Επανάληψη ψεκασμού με χαλκούχο σκεύασμα αμέσως μετά το κλάδεμα.

Σ Ε Ζ Ι Α :
(*Sesia myopiformis*)

Οδηγίες:

Ξυλοφάγο έντομο κορμού και κύριων βραχιόνων που γεννά κυρίως σε πληγές ή σχισμές. Στο σημείο της πληγής - σχισμής ανασηκώνοντας το φλοιό, την εποχή αυτή, παρατηρούνται καφέ αποχωρήματα και κάμπιες χρώματος ζαχαρι με καστανή κεφαλή μεγέθους μέχρι 2,5 εκ..

Για τη μείωση του πληθυσμού συνιστάται:

- Επάλειψη κορμού και χοντρών βραχιόνων με μίγμα θερινού ορυκτέλαιου και chlorpyrifos μέχρι το τέλος του Νοέμβρη.
- Κατά το κλάδεμα αφαίρεση και κάψιμο των ξηρών και εξασθενημένων κλάδων.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Ηράκλειο 14 Νοεμβρίου 2013

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τρουλλάκης Ιωάννης

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkrfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ – ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)



Φουζικλάδιο. Προσβολή σε καρπό (δερματώδης βούλα).



Βακτηριακό κάψιμο. Έλκος σε κλαδίσκο. Το βακτήριο διαχειμάζει στα έλκη.



Σέξια. Προνύμφη και αποχωρήματα κάτω από το φλοιό βραχίονα μηλιάς.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Εράγγελος Α. Αλατσατιανός

7.

<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Fusicladium dendriticum</i>) (<i>Fusicladium pyrinum</i>) (Μηλιά - Αχλαδιά) Οδηγίες:</p>	<p>Η ασθένεια εκδηλώθηκε φέτος σε αχλαδιές και μηλιές του οροπεδίου Λασιθίου. Όπου εκδηλώθηκαν σοβαρές προσβολές συστήνεται αμέσως μετά τη φυλλόπτωση ψεκασμός των πεσμένων φύλλων με διάλυμα ουρίας 5% ή παράχωμα τους στο έδαφος. <u>Παρατήρηση</u> Το παραπάνω μέτρο είναι πιο αποτελεσματικό στις μηλιές όταν εφαρμόζεται από όλους στην ίδια περιοχή. Στις αχλαδιές το μόλυσμα παραμένει εκτός από τα πεσμένα φύλλα και πάνω στους προσβεβλημένους βλαστούς του δέντρου. Για το λόγο αυτό κατά το χειμερινό κλάδεμα οι βλαστοί που εμφανίζουν την ασθένεια να αφαιρούνται και να καίγονται.</p>
<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (<i>Erwinia amylovora</i>) (Αχλαδιά)</p>	<p>Ελάχιστες προσβολές εκδηλώθηκαν τη φετινή περίοδο στις αχλαδιές. Για την αντιμετώπιση του συνιστάται:</p> <ul style="list-style-type: none">• Επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα στη μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση κατά τη φυλλόπτωση.• Κατά το κλάδεμα να αφαιρούνται τα ξερά κλαδιά μαζί με τμήμα υγιούς ξύλου μήκους τουλάχιστον 20 εκ. και να καίγονται. Οι εργασίες κλαδέματος να γίνονται με ξηρό καιρό, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με οινόπνευμα του εμπορίου και οι μεγάλες τομές να επαλείφονται με απολυμαντικό πληγών.• Επανάληψη ψεκασμού με χαλκούχο σκεύασμα αμέσως μετά το κλάδεμα.

Σ Ε Ζ Ι Α :
(*Sesia myopiformis*)

Οδηγίες:

Ξυλοφάγο έντομο κορμού και κύριων βραχιόνων που γεννά κυρίως σε πληγές ή σχισμές. Στο σημείο της πληγής - σχισμής ανασηκώνοντας το φλοιό, την εποχή αυτή, παρατηρούνται καφέ αποχωρήματα και κάμπιες χρώματος ζαχαρι με καστανή κεφαλή μεγέθους μέχρι 2,5 εκ..

Για τη μείωση του πληθυσμού συνιστάται:

- Επάλειψη κορμού και χοντρών βραχιόνων με μίγμα θερινού ορυκτέλαιου και chlorpyrifos μέχρι το τέλος του Νοέμβρη.
- Κατά το κλάδεμα αφαίρεση και κάψιμο των ξηρών και εξασθενημένων κλάδων.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Ηράκλειο 14 Νοεμβρίου 2013

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Ιωάννης