



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

33/ 21-6-16

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

Οδηγίες Φυτ/κά προϊόντα: Στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Άμεσα με: Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ημ.), Ντιφλουμπενζουρόλ(30 ημ.), Φενοξυκάρμπ (30 ημ.), Χλοραντρανιλιπρόλ (14 ημ.).

2. Μέχρι 24 Ιουνίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Μεθοξυφenoζάντ (14 ημ.), Τεμπουφenoζάντ (14 ημ.).

3.Από 25 ως 29 Ιουνίου με:

Δελταμεθρίν (7 ημ.), Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.), Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινοσάντ (14 ημ.), Τ-Φλουβαλινέιτ (30 ημ.), Φοσμέτ(28 ημ.), Χλωπυριφός μεθύλ (21 ημ.).

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Μέχρι 24 Ιουνίου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ ψεκαστικού διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

2. Από 25 ως 29 Ιουνίου με:

Δελταμεθρίν, Χλωπυριφός μεθύλ, Χλωπυριφός.

Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών αναμένεται η έναρξη της δεύτερης πτήσης τις επόμενες μέρες. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2.ΨΥΛΛΑ

Διαπιστώσεις: Στις δειγματοληψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη νυμφών τελευταίων σταδίων, λίγες νέες εναποθέσεις αυγών και ακμαία.

Οδηγίες: **Όπου υπάρχουν προσβολές (10 νύμφες ανά βλαστό), να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα με προσθήκη θερινού λαδιού σε δένδρα ποτισμένα και με ιδιαίτερη προσοχή στις θερμοκρασίες.**

Να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική ουσία. ▶

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ακρυναθρίν, Αμπαμεκτίν (δρά και σε ηλικιωμένες νύμφες Ν5), Αμπαμεκτίν+Χλοραντраниλιπρόλ (δρά σε αυγά και νύμφες), Ιμιντακλοπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν (δρά σε αυγά και νύμφες), Σπινοσάντ, Σπιροτετραμάτ (δρά σε νύμφες), Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Φενοξυκάρμπ (δρά σε αυγά και νύμφες), Χλωπυριφός μεθύλ.

ΑΧΛΑΔΙΑ - ΜΗΛΙΑ

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες με προσβολές να συνεχιστεί η προστασία. Ο μύκητας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 24ο C αδρανοποιείται. Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες:

Να γίνονται συχνότατα επιτόπιοι έλεγχοι. Όταν διαπιστώνετε προσβολές να λαμβάνονται τα αναφερόμενα σε προηγούμενο δελτίο καλλιεργητικά μέτρα.

3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΜΗΛΙΑ

Οδηγίες:

**Η έναρξη της πτήσης αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Με βάση τον Καν (ΕΕ)2016/60 έγινε τροποποίηση της έγκρισης των ΦΠ με δραστική ουσία το **χλωρπυριφός**. Σε **αχλαδιές απαγορεύεται η χρήση του μετά την άνθηση.**
- Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί σε πρώιμες ποικιλίες. Οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή.
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ