

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΧΘΡΟΣ								ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
	ψευδόκοκκος	Κοκκοειδή	Τζιτζικάρια	Κιτρινός τετράνυχος	Κοκκινός τετράνυχος	Ευδεμίδα	(Eriophyes)	Θρίπες	(ΗΜΕΡΕΣ)
<u>Abamectin</u>				✓	✓		✓		28
<u>Alpha-cypermethrin</u>			✓			✓			7
<u>Bacillus thuringiensis</u>						✓			0
<u>Cypermethrin</u>						✓			7
<u>Cypermethrin</u>			✓			✓			21
<u>Clofentezine</u>				✓	✓				30(Μόνο οиноποιήσιμα)
<u>Deltamethrin</u>			✓			✓			7
<u>Fenoxycarb</u>						✓			20
<u>Lambda cyhalothrin</u>						✓			7
<u>Lambda cyhalothrin</u>			✓			✓		✓	9
<u>Fatty acid potassium salt</u>	✓	✓	✓					✓	μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και πριν τη συγκομιδή
<u>Pyrethrins</u>			✓			✓			2
<u>Pyriproxyfen</u>	✓								Πριν την ανθοση
<u>Emamectin</u>						✓			7
<u>(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate</u>						✓			Παρεμποδιστής σύζευξης
<u>Beta-cyfluthrin</u>			✓			✓			14
<u>Indoxacarb</u>			✓			✓			10
<u>Methiocarb</u>								✓	42
<u>Methoxyfenozide</u>						✓			14 οиноποιήσιμα / 7 επιτραπέζια
<u>Esfenvalerate</u>						✓			14
<u>Etoazole</u>				✓	✓				28
<u>Etofenprox</u>						✓			14
<u>Hexythiazox</u>				✓	✓				35
<u>Spirodiclofen</u>				✓	✓				14
<u>Spirotetramat</u>	✓								14
<u>paraffin oil</u>					✓				Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο της καλλιέργειας, όταν γίνεται η εφαρμογή)
<u>Chlorantraniliprole</u>						✓			30 οиноποιήσιμα / 3 επιτραπέζια
<u>Chlorantraniliprole+ Thiametoxame</u>			✓			✓			30 οиноποιήσιμα / 14 επιτραπέζια
<u>Chlorpyrifos</u>	✓		✓			✓			30
<u>Chlorpyrifos methyl</u>	✓					✓			21
<u>Tau-Fluvalinate</u>				✓					21(Μόνο οиноποιήσιμες)
<u>Thiametoxame</u>			✓						28 οиноποιήσιμα/21 επιτραπέζια
<u>Tebufenozide</u>						✓			21
<u>Formetanate</u>								✓	Επιτραπέζια (Εναρξη άνθησης)
<u>Spinosad</u>						✓		✓	14
<u>Sulphur</u>								✓	7

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καβάλα 01/04/2014