

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



**Περονόσπορος.** Κίτρινες κηλίδες στην πάνω επιφάνεια του φύλλου. Μοιάζουν με λασδιάς και είναι λείες χωρίς εξογκώματα ή βαθουλώματα.



**Ωίδιο.** Κηλίδες όπως φαίνονται στην πάνω επιφάνεια. Είναι πιο ανοιχτού χρώματος και λιγότερο έντονες από τον περονόσπορο.



**Ερίωση.** Εξογκώματα στην πάνω επιφάνεια του φύλλου. Από την κάτω πλευρά υπάρχουν βαθουλώματα που έχουν μέσα μικρές λευκές τρίχες.



**Τζιτζικάκι.** Νύμφες στο φύλλωμα. Μοιάζουν με πολύ μικρά τζιτζικάκια, λευκοπράσινα που μετακινούνται εύκολα με πτέγαγμα ή πλάγιο βάδισμα.

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός

6.

### ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

(*Plasmopara viticola*)

#### Διαπιστώσεις:

– Η ασθένεια έχει εντοπιστεί διάσπαρτα σε όλες σχεδόν τις αμπελουργικές περιοχές και **βρίσκεται σε φάση επέκτασης.**

– Οι καιρικές συνθήκες του Απριλίου (συχνοί νότιοι άνεμοι, περιορισμένες βροχές, χαμηλή σχετική υγρασία) συγκράτησαν την εξέλιξη του και περιόρισαν τη δυναμική του.

– Η παρουσία του δεν ανιχνεύεται αμέσως. Διατηρείται σε λανθάνουσα κατάσταση που μπορεί να ενεργοποιηθεί κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν (βροχές, δροσιές). Οι βροχές στις 27 Απριλίου ύψους 3 έως 14 χιλ., πιθανόν να ενεργοποιήσουν μολύσματα και καινούργιες προσβολές.

Η καιρική αστάθεια της εποχής (βροχές, έντονες δροσιές) και η κρισιμότητα των σταδίων επιβάλλουν διαρκή επιτήρηση των αμπελιών.

#### Οδηγίες:

– **Κάνετε συστηματικό έλεγχο των αμπελιών.** Ελέγχετε φύλλα και σταφύλια (πολλές φορές "χτυπά" κατευθείαν στα σταφύλια).

– **Σε αμπέλια με συμπτώματα της ασθένειας να γίνει αμέσως ψεκασμός** (να προτιμηθούν διασυστηματικά ή διελασματικά σκευάσματα).

– Μελλοντικές βροχές ή περιοδοί με έντονες δροσιές να βρίσκουν **όλα τα αμπέλια** ψεκασμένα (παρακολουθείτε τα δελτία καιρού της ΕΜΥ).

**Σημείωση:** Την περίοδο αυτή λόγω της μεγάλης αύξησης της βλάστησης (μέχρι 30-40 εκ. την εβδομάδα), η χρονική διάρκεια δράσης των φαρμάκων μειώνεται σε σημαντικό βαθμό.

<p><b>ΩΙΔΙΟ:</b> (<i>Erysiphe necator</i>)</p>	<p>Υπάρχουν δευτερογενείς προσβολές, για την ώρα στο φύλλωμα. <b>Σε αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία καταπολέμηση να γίνει επέμβαση.</b> Να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης.</p>
<p><b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:</b> (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Άρχισε νωρίς η μετακίνηση του στα αμπέλια. Να γίνεται έλεγχος στην ακραία βλάστηση και <b>όπου εμφανίζεται να γίνεται επέμβαση.</b> Τα χλωρά κλαδέματα που γίνονται την περίοδο αυτή βοηθούν στον έλεγχο των πληθυσμών του εντόμου.</p>
<p><b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</b> (<i>Lobesia botrana</i>)</p>	<p>Δεν υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης την περίοδο αυτή.</p>
<p><b>ΕΡΙΝΩΣΗ:</b> (<i>Eriophyes vitis</i>)</p>	<p>Δημιουργεί εξογκώματα που μοιάζουν με “φουσκάλες”. Στα αρχικά στάδια συγχέονται με συμπτώματα περονόσπορου. Συνήθως δεν προκαλεί ζημιές οικονομικής σημασίας. Οι εφαρμογές με θειάφι επίπασης κατά του ωιδίου περιορίζουν το άκαρι.</p>

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας αποστείλαμε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 28 Απριλίου 2014  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Τρουλλάκης Γιάννης