



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

35/11-7-13

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσεις:

Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε ότι η έξοδος των νεαρών ερπουσών των δύο κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη.

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:

α) Πρώιμες περιοχές: 16 έως 20 Ιουλίου.

β) Όψιμες περιοχές: 21 ως 25 Ιουλίου.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός, Πυριπροξιφέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ.

Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Για αυτή τη γενιά ο συνδυασμός είναι περισσότερο αποτελεσματικός.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την κόκκινη ψώρα.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ.

3.ΚΟΚΚΟΣ (*Coccus hesperidum*)

Μοιάζει με το Λεκάνιο είναι μικρότερο σε μέγεθος πιο πεπλατυσμένο και κιτρινοκάστανο. Προσβάλλει και άλλα οπωροφόρα και καλλωπιστικά. Στα μελιτώδη εκκρίματά του αναπτύσσεται καπνιά.

Διαπιστώσεις:

Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση από 16 έως 20 Ιουλίου.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός.



4.ΛΕΚΑΝΙΟ

Διαπιστώσεις:

Στους ελέγχους μας διαπιστώθηκε έξοδος νεαρών ερπουσών σε ποσοστό 60-70%.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση από 16 έως 20 Ιουλίου.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ, Φενοξυκάρμπ, χλωρπυριφός, χλωρπυριφός-μεθύλ.

5.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες:

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Να συνεχιστεί η προστασία σε όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια.

6. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες:

Βλέπε δελτίο 31/13-6-13.

Β. ΕΛΙΑ

1.ΛΕΚΑΝΙΟ

Οδηγίες:

Σε ελαιώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση από 16 έως 20 Ιουλίου.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Σπιροτετραμάτ, Φενοξυκάρμπ, χλωρπυριφός-μεθύλ.

2.ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

Το έντομο προσβάλλει φύλλα νεαρούς βλαστούς και καρπούς.

Οδηγίες:

Σε νεαρά δενδρύλλια, νεοσύστατους ελαιώνες και φυτώρια που διαπιστώνονται προσβολές να γίνει καταπολέμηση με εγκεκριμένο σκεύασμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- 2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ