



Ακμαιο ευδεμίδας



Προνύμφη ευδεμίδας



Βοτρυτής



Ωίδιο

Ταχ. Δίψη:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ. : 2510800421

Φακ: 2510800430

Πληροφορίες: Κ. Λίλης-Δ.Πουργιώτη-
Θ. Μαρκόπουλος.

Τηλ:2510-600421-422-420

Αρ. Δελτίου:09/25-07-13

ΑΜΠΕΛΙ

I. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Ξεκίνησε η γ' πτήση του εντόμου της ευδεμίδας μετά από μια παρατεταμένη περίοδο μηδενικών πτήσεων το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουλίου. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι πολύ χαμηλός έως μέτριος. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος προσβολής των σταφυλιών και εμφάνισης δευτερογενών προσβολών όπως βοτρυτής, όξινη σήψη κ.ά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτή τη γενιά.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν προληπτικά οι παρακάτω ψεκασμοί:

- **27 -28 Ιουλίου** στις πρώιμες περιοχές
- **28 -29 Ιουλίου** στις μεσοπρώιμες περιοχές και
- **30 - 31 Ιουλίου** στις όψιμες περιοχές

Να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλό λούσιμο των πρέμνων. Οι παραπάνω ψεκασμοί να επαναληφθούν μετά από **7 -8** ημέρες.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας.

II. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας σε αμπέλια που έχει εντοπισθεί η ύπαρξη του ψευδόκοκκου. Χρειάζεται να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλή διαβροχή των πρέμνων με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν.



Συστήνεται η χρήση
φυτοφαρμάκων
σημαίνει



καλύτερη
φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία
της φύσης
και του
καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν

III.ΘΡΙΠΑΣ

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και αν παρατηρήσουν πληθυσμούς θρίπα να κάνουν καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν, κυρίως στις όψιμες ποικιλίες. Σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης δεν ψεκάζονται.

IV. ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση της ασθένειας σε συνδυασμό με τον ψεκασμό για την ευδεμίδα. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις όψιμες ποικιλίες. Σταφύλια που βρίσκονται στην αρχή της ωρίμανσης ή και ώριμα δεν ψεκάζονται.

V. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Να γίνουν προληπτικοί ψεκασμοί σε αμπέλια όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο κατά το στάδιο της ωρίμανσης των σταφυλιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα σκεπαστά αμπέλια και σε αμπέλια υγρών περιοχών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών σύμφωνα με το υπ' αριθ. 03/08-04-2013 Τεχνικό Δελτίο της Υπηρεσίας μας.
2. Να χρησιμοποιηθούν γ. φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
Σταφύλια έτοιμα προς συγκομιδή δεν ψεκάζονται
3. Όλοι οι παραπάνω ψεκασμοί να γίνουν **μόνο** εφόσον λάβουμε υπόψη την **υπολειμματική διάρκεια** των γεωργικών φαρμάκων και το **στάδιο ωρίμανσης** των σταφυλιών και
4. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο

Προιστάμενος Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή