

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: [pkpfhgpr@otenet.gr](mailto:pkpfhgpr@otenet.gr)



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ Π Α Τ Α Τ Α Σ

### (ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)



**Περονόσπορος πατάτας.** Συμπτώματα σε φύλλα και βλαστούς.

*Πληροφορίες:* Νικόλαος Ι. Μπαγκής

1.

**Στο οροπέδιο Λασιθίου,** οι περιορισμένες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την άνοιξη επέτρεψαν την ομαλή φύτευση της πατάτας.

Οι φυτεύσεις ξεκίνησαν από τα τέλη Μαρτίου, κλιμακώθηκαν μέσα στον Απρίλιο και ολοκληρώθηκαν στο 1<sup>ο</sup> δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

<b>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:</b> <i>(Phytophthora infestans)</i>	<p>- Το διήμερο 8 - 9 Ιουνίου επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από περονόσπορο.</p> <p>- Σημειώθηκε χαμηλό ύψος βροχής 2 χιλ., αλλά επικράτησαν συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας ( μέση υγρασία 87%) και διωγράνσεις φύλλου συνεχούς διάρκειας επί 33 ώρες, με μέση θερμοκρασία 14,3 °C .</p> <p>- Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την εμφάνιση προσβολών στις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στις πατατοκαλλιέργειες που έχουν ξεπεράσει το βλαστικό στάδιο του «κλεισίματος των φυτών».</p> <p>- Η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν την περίοδο αυτή δεν ευνοούν την γρήγορη εξάπλωση της ασθένειας. Ωστόσο, επειδή στο κλίμα του οροπεδίου Λασιθίου τον μήνα Ιούνιο παρουσιάζεται τακτικά υψηλή υγρασία, ο περονόσπορος μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα.</p>
<b>Διαπιστώσεις:</b>	
<b>Οδηγίες:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Συνιστάται για τις καλλιέργειες που βρίσκονται λίγο πριν ή μετά το στάδιο του κλεισίματος να γίνει επέμβαση το αργότερο έως 18 - 19 Ιουνίου με διασυστηματικά ή διεσδοτικά σκευάσματα.</li> <li>• Στις υπόλοιπες καλλιέργειες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης (όψιμες φυτεύσεις) να γίνεται έλεγχος και εφόσον εντοπίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα καταπολέμηση.</li> </ul>

**ΦΑΡΜΑΚΑ:** Τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια και την ασθένεια σκευάσματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην διεύθυνση: [http://www.minagric.gr/syspest/syspest\\_bfuncs\\_crops.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx)

Σε κάθε περίπτωση διαβάστε με προσοχή και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φαρμάκων.

Ηράκλειο 16 Ιουνίου 2016  
 Η Προϊστάμενη Τμήματος  
 Κληρονόμου Ευφροσύνη