

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ

### ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



**Καρπόκαψα.** Προσβολή νεαρού καρπού.



**Καρπόκαψα.** Εσωτερικά η προσβολή. Διακρίνεται η προνύμφη του εντόμου



**Σέξια.** Προνύμφη κάτω από το φλοιό βραχίονα μηλιάς.



**Φουζικλάδι.** Κηλίδες σε φύλλα αχλαδιάς.



**Φουζικλάδι.** Προσβολή καρπιδίου αχλαδιάς.



**Ωίδιο.** Προσβολή και εξανθήσεις σε νεαρή βλάστηση.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

<p><b>ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :</b> (<i>Carpospsa pomonella</i>) Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά Οδηγίες:</p>	<p>Στο οροπέδιο Λασιθίου, το διάστημα που διανύουμε, οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης είναι αυξημένες και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν δυναμικές ωτοκίες. Αναμένονται μαζικές εκκολάψεις τις επόμενες ημέρες. <b>Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών και του φυλλώματος.</b> Οι εφαρμογές να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων και τα μεσοδιαστήματα εφαρμογών (ετικέτα). Ενδεικτικές ημερομηνίες ψεκασμού : <b>22 - 24 Μαΐου.</b></p>
<p><b>ΣΕΖΙΑ :</b> (<i>Sesia myoriformis</i>) (Μηλιά)</p>	<p>Την εποχή αυτή ωτοκεί σε σχισμές, έλκη και τομές στα χοντρά μέρη του δέντρου (κορμό και βραχίονες). <b>Να συνεχιστεί η προστασία</b> του κορμού και των βραχιόνων με κατευθυνόμενο ψεκασμό και καλή διαβροχή.</p>
<p><b>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :</b> (<i>Fusicladium dendriticum</i>) (<i>Fusicladium pyrinum</i>) Οδηγίες:</p>	<p>- Στις <u>μηλιές</u> διαπιστώνονται προσβολές κατά τόπους και σε ευαίσθητες ποικιλίες. - Στις <u>αχλαδιές</u>, ιδιαίτερα σε υγρές θέσεις, διαπιστώνονται προσβολές (κηλίδες σε φύλλα και καρπούς με σκουρόχρωμες βελούδινες εξανθήσεις). <b>Στις μηλιές και στις αχλαδιές</b> που εμφανίζονται συμπτώματα, πρέπει να γίνεται προστασία σε περιόδους με έντονες δροσιές ή πιθανές βροχές.</p>
<p><b>ΩΙΔΙΟ (Μηλιά) :</b> (<i>Oidium farinosum</i>)</p>	<p>Στις μηλιές και στις ποικιλίες που διαπιστώνονται συμπτώματα να γίνεται αντιμετώπιση.</p>

**ΦΑΡΜΑΚΑ:** Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας.

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Οι εγκεκριμένες δραστικές στην καρυδιά για την καταπολέμηση της καρπόκαψας και η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή είναι: chlorantraniliprol - 21ημ., deltamethrin - 30ημ., phosmet - 7ημ. Στην βιολογική καλλιέργεια έχουν έγκριση οι ιοί τύπου κοκκιώσεων και οι παρεμποδιστές σύζευξης.

Ηράκλειο 19 Μαΐου 2016  
Η Προϊστάμενη Τμήματος  
Κληρονόμου Ευφροσύνη

## Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες σε μηλοειδή για την καρπόκαφα

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Καλλιέργεια M=Μηλιά / A=Αχλαδιά	Βιολογική καλλιέργεια	Στάδιο του εντόμου που δρα το εντομοκτόνο A=αυγά Πρ=Προνύμφη	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά έτος	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
1B	Chlorpyrifos	M/A		Πρ	Κατά την εκκόλαψη των αυγών - Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών	2	30
	Chlorpyrifos-methyl	M/A		Πρ		1	21
	Phosmet	M/A		Πρ		2	28
3A	Beta-cyfluthrin	M/A		Πρ		2	7
	Deltamethrin	M/A		Πρ		2	7
	Etofenprox	M		Πρ		3	7
	Lambda cyhalothrin	M/A		Πρ		2	9
	Lambda cyhalothrin	M/A		Πρ		2	7
	Tau - fluvalinate	M/A		Πρ		2	30
4A	Thiacloprid	M/A		Πρ		2 - 3	14
22A	Indoxacarb	M/A		Πρ		3	10
	Virus granulosis Ιοί τύπου κοκκιώσεων	M/A	+	Πρ		10	1 ή 3
5	Spinosad	M/A	+	Πρ		3	ΜΗΛΙΑ 7 ΑΧΛΑΔΙΑ 7/14
6	Emamectin benzoate	M		Πρ		3	3
7B	Fenoxycarb	M/A		A, Πρ		Κατά την εναπόθεση των αυγών	2
15	Diflubenzuron	M/A		A, Πρ	2		14
18	Methoxyfenozide	M/A		A, Πρ	3		14
	Tebufenozide	M/A		(A), Πρ	4		14
28	Chlorantraniliprole	M/A		A, Πρ	2		14
	Chlorantraniliprole + abamectin	M/A		A, Πρ	2		14
	Δραστικές παρεμπόδισης σύζευξης (Διάφορα σκευάσματα)	M/A	+	Εναντιον αρσενικών	Με τις πρώτες συλλήψεις αρσενικών	1 - 2	0 ή 3

Η ομαδοποίηση των δραστικών είναι σύμφωνη με τον διεθνή οργανισμό I.R.A.C.

Συνιστάται για την διαχείριση της ανθεκτικότητας η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική ομάδα δράσης.

Τελευταία ενημέρωση 20 Απριλίου