

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
**ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ**
Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη 38334
Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 66525
Fax : 24210 69545
e- mail: fyto12@otenet.gr
Πληροφορίες : Msc Ι. Παππά, Δρ. Θ. Μόσχος

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
- βλάπτει την υγεία των
καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ
No 5 /5-5-2014.

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ (Κερασιά):

Η δραστηριότητα των ακμαίων έχει ξεκινήσει. Τα ακμαία του εντόμου εισάγουν τα αυγά στους καρπούς όταν αυτοί βρίσκονται στο στάδιο της αλλαγής του χρώματος. Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός στο στάδιο έναρξης αλλαγής του χρώματος, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. **Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: (*Bauveria bassiana* , thiamethoxam, deltamethrin)



Εκόνα1: Ακμαίο της Ραγολέτιδας πάνω σε κεράσι.

Εκόνα2: Προνύμφες ραγολέτιδας μέσα σε ώριμο κεράσι

Το πραγματικό της μήκος είναι 3,5-5 χιλιοστά

ΑΦΙΔΕΣ (ΜΕΛΙΓΚΡΕΣ) ΚΕΡΑΣΙΑ

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση του εντόμου. Συστήνεται η συνέχιση των ψεκασμών όπως περιγράφονται σε προηγούμενο ΔΓΠ (3/8-4-2014). **Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**

ΜΟΝΙΛΙΑ:

Ο βροχερός - υγρός καιρός προκαλεί σχίσμο των καρπών και ευνοεί την προσβολή των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση από την ασθένεια. Εφόσον οι καιρός συνεχίσει να είναι βροχερός και υγρός, συστήνεται να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός, με εγκεκριμένο για το στάδιο ανάπτυξης και την ασθένεια μυκητοκτόνο, για την προστασία του ώριμου καρπού.



Εικόνα 3: Προσβολή από μονίλια σε κεράσια

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται για την ασθένεια αναφέρονται σε προηγούμενο ΔΓΠ (2/5-3-2014). Από αυτά θα πρέπει να επιλεγούν τα σκευάσματα που επιτρέπονται για το στάδιο της ωρίμανσης, με την μικρότερη δυνατή υπολειμματική δράση (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή). Τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να προτιμηθούν.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

Λύκας Δημήτρης