



Φύλλα προσβεβλημένα από κυκλοκόνιο

Πληροφορίες: Λίλης Κων/νος - Δ. Πυργιώτη Αριθμός Δελτίου:12/8-10-2013
Τηλ.: 2510/600421 - 422

ΕΛΙΑ

I. ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Ασθένεια πολύ διαδεδομένη όπου καλλιεργείται η ελιά. Προσβάλλει τα φύλλα τους κλαδίσκους και τις ταξιανθίες των ελαιοδένδρων, κυρίως όμως προκαλεί ζημιές στα φύλλα. Με την προσβολή των φύλλων παρατηρείται εξασθένηση των δένδρων, φυλλόπτωση και σε έντονες προσβολές έχουμε μερική ή ολική ακαρπία.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στα φύλλα εμφανίζονται μικρές κυκλικές κηλίδες σταχτόχρωμου χρώματος με χρυσοκίτρινο κύκλο γύρω τους, διαμέτρου 0,5 - 1 εκ. Ιδανικές συνθήκες για την ασθένεια είναι οι βροχοπτώσεις, η υγρασία και θερμοκρασίες από 10 έως 22 ° C ,κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνει άμεσα ένας ψεκασμός για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Θα πρέπει να γίνει καλό λούσιμο των δένδρων. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε ελαιοκτήματα υγρών περιοχών και όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο, να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από 25 - 30 ημέρες, απαραίτητος για τις υγρές περιοχές. Ενδεικτική τιμή ψεκαστικού υγρού κατά στρέμμα είναι 150-200 λίτρα για δένδρα ηλικίας 10 χρονών και πάνω.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

1. Βορδιγάλειος πολτός (διάφορα σκευάσματα)
2. Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα)
3. Υδροξείδιο του χαλκού (διάφορα σκευάσματα)
και άλλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση του κυκλοκονίου.

Η υπολειματική διάρκεια των χαλκούχων σκευασμάτων για την ελιά είναι 21 ημέρες. Να προτιμούμε όμως η συλλογή να γίνεται σε περισσότερες ημέρες από τον τελευταίο ψεκασμό.



Ταχ. Δίλση:

Αγ. Λουκάς
Τέρμα Αμυνταίου
65110 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ.: 2510600421
Fax: 2510600430

Σωστή χρήση
φυτοφαρμάκων
σημαίνει
καλύτερη
φυτοπροστασία
οικονομία
προστασία
της φύσης
και του
καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν

II ΚΑΠΝΙΑ

Είναι το μαύρισμα που παρατηρείται στα φύλλα και στους βλαστούς των ελαιοδένδρων. Δημιουργείται από μύκητες που αναπτύσσονται στα μελιτώματα των κοκκοειδών. Αντιμετωπίζεται με χαλκούχα σκευάσματα ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση του κυκλοκονίου. Καλύτερη αντιμετώπιση επιτυγχάνεται με την καταπολέμηση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή

III ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ

Η ασθένεια προέρχεται από την είσοδο του βακτηρίου ψευδομονάς στις πληγές και σχισμές του φλοιού των κλάδων της ελιάς. Ιδανικές συνθήκες για την είσοδο του βακτηρίου υπάρχουν μετά το κλάδεμα, χαλάζι, παγετό, συγκομιδή. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της καρκίνωσης είναι οι όγκοι που δημιουργούνται στους βραχίονες και στους βλαστούς των ελαιοδένδρων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων και κλάδων και όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μεγάλους βραχίονες συνιστάται να γίνεται αφαίρεση των όγκων και απολύμανση των πληγών. Προληπτικά για να μην δημιουργηθούν όγκοι θα πρέπει να γίνεται πάντα ένας ψεκασμός με ένα χαλκούχο σκεύασμα μετά από χαλάζι, παγετό, συλλογή και κλάδεμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Η
Προϊσταμένη Δ/νσης

Αδαμίδου ζωή