

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ Α Μ Π Ε Λ Ι



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ρώγα (διακρίνεται η τρύπα).



Μύγα Μεσογείου. Νύγματα σε ρώγες (δε διακρίνεται τρύπα).



Ωίδιο. Προσβολή σε άξονες και μίσχους σταφυλιών.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής – Βαγγέλης Α. Αλατοσιανός

16.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>)	Στις μεσοπρώιμες περιοχές η τρίτη πτήση συνεχίζεται με αυξημένους πληθυσμούς. Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες για τις μεσοπρώιμες περιοχές (όπως Αρχάνες, Δαφνές, Βενεράτο, Κ. Ασίδες, Αγ.Μύρων, Πενταμόδι, Κρουσώνας, Κυπαρίσσι, Πρ.Ηλίας, Φοινικιά, Γκαγκάλες, Σοκαράς, Ασήμι, Πραιτώρια, Πύργος, Χάρακας, Μεσοχωριό, Γαρόπα, Λιγόρτυνο, Τεφέλι, Μονή Επανωσήφη, Μορτιά, Επισκοπή, Αγ.Παρασκιές, Αρκαλοχώρι, Γαζέπι Μύλος, κλπ):
Οδηγίες:	<ul style="list-style-type: none">➤ Επιτραπέζια: 23 -25 Ιουλίου.➤ Σουλτανίνες - Οινάμπελα: 25 - 27 Ιουλίου.
Τρόπος επέμβασης:	Το φάρμακο να καλύπτει καλά τα σταφύλια. Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.
ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)	Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των αμπελιών που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση . Οι όψιμες προσβολές ωιδίου στους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών (λίκια) υποβαθμίζουν την εμπορική τους αξία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Ο χαρακτηρισμός της ζώνης προωμότητας για κάθε περιοχή είναι ενδεικτικός. Υπάρχουν αμπέλια στην ίδια περιοχή με διαφορετική προωμότητα λόγω των πολλών τοπικών μικροκλιμάτων. Οι παραγωγοί είναι εκείνοι που σε συνεργασία με τους τοπικούς συμβούλους θα πρέπει να καθορίζουν τη ζώνη που ανήκουν τα αμπέλια τους.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Απαγορεύεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από ψεκασμένα αμπέλια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η χρήση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια φαρμάκων. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις κατά τους τακτικούς ελέγχους υπολειμμάτων στα σταφύλια προβλέπονται από τον νόμο αυστηρές κυρώσεις.

Ε Λ Ι Α



Προνύμφη μαργαρόνιας με προσβολή σε φύλλο και καρπό ελιάς.



Καρποί ελιάς προσβεβλημένοι από μαργαρόνια.



Έντονη ζημιά από προνύμφες μαργαρόνιας στη νεαρή βλάστηση αυστηρά κλαδεμένου δέντρου.

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ:

(*Palpita unionalis*)

Στις όψιμες περιοχές παρατηρούνται χαμηλές συλλήψεις.

Συνιστάται ψεκασμός στους ελαιώνες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές στη βλάστηση ή στους καρπούς. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιόδεντρα με τρυφερή βλάστηση όπως φυτώρια, δέντρα νεαρής ηλικίας και δέντρα που έχουν δεχτεί κλάδεμα ανανέωσης.

Χρόνος επέμβασης:

– **Όψιμες περιοχές: 26 - 29 Ιουλίου.**

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Για την αντιμετώπιση της μαργαρόνιας στην ελιά εγκρίθηκε σκεύασμα με δραστική ουσία **deltamethrin (δελταμεθρίν)**, με μέγιστο αριθμό εφαρμογών μία ανά καλλιεργητική περίοδο και 7 ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Ηράκλειο 22 Ιουλίου 2013

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Γιάννης