

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Άγιος Λουκάς - Τέρμα Αμυνταίου, 65110 Καβάλα, Fax : 2510 600430, e mail : pkpfpeka@otenet.gr

Πληροφορίες : Πυργιώτη Δήμητρα - Ηλιάδου Μαρία (τηλ. 2510 600422-1)

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ

Βλαστικό στάδιο

Παρατηρείται έναρξη της ανθοφορίας της ελιάς στην περιοχή της Σαμοθράκης.

Στις υπόλοιπες πρώιμες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο Ε (διαφοροποίηση της στεφάνης) και αναμένεται έναρξη της ανθοφορίας τις επόμενες ημέρες.

Τη φετινή χρονιά παρατηρείται οψιμότητα 7 ημερών σε σχέση με την περσινή και προβλέπεται μέτρια ανθοφορία.

Πυρηνοτρήτης (*Prays oleae*)



Η πτήση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι υψηλός και η πτήση συνεχίζεται. Παρατηρούνται ωοτοκίες στις ανθοταξίες και αναμένεται η έξοδος των σκουληκιών τις επόμενες ημέρες.

Ψεκασμοί :

Έχοντας υπόψη τους υψηλούς πληθυσμούς του πυρηνοτρήτη και τη μέτρια ανθοφορία κρίνεται απαραίτητο και συνιστάται στους ελαιοκαλλιεργητές να ξεκινήσουν άμεσα τους ψεκασμούς στην περιοχή της Σαμοθράκης και τις επόμενες μέρες στις πρώιμες περιοχές και στη συνέχεια στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το βλαστικό στάδιο της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα) ή ακόμη και στο ξεκίνημα της ανθοφορίας.

Ψύλλα (βαμβακάδα) *Euphyllura phillyreae*

Παρατηρήθηκαν χαμηλοί έως μέτριοι πληθυσμοί ψύλλας, κυρίως σε ελαιοκλήματα όπου δε γίνονται συστηματικοί



ψεκασμοί. Όπου υπάρχει πρόβλημα βαμβακάδας να γίνει ένας ψεκασμός σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

Ακάρια

Τα ακάρια προκαλούν παραμορφώσεις στα φύλλα και στους καρπούς των ελαιοδέντρων, υποβαθμίζοντας την ποιότητα των καρπών, ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

Ψεκασμοί :

Όπου υπάρχει πρόβλημα ακάρεων, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός με την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει το μέγεθος της κεφαλής καρφίτσας. Ο επαναληπτικός ψεκασμός είναι απαραίτητος μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

Παρλατόρια (*Parlatoria oleae*)

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου λίγο πριν την ανθοφορία με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις επιτραπέζιες ποικιλίες και σε ελαικτήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.



σημείωση :

- 1.** Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους εχθρούς και να ελέγχεται η συδυαστικότητά τους.
- 2.** Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

♦ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.minagric.gr (Γεωργικές προειδοποιήσεις).

Ο

Προϊστάμενος Τμήματος

Ρώμας Δημήτριος