

Να  
 κρατηθεί  
 σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της **Μηλιάς**  
 και της **Αχλαδιάς**

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ	ΚΟΚΚΟΕΘΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
acetamiprid ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ			+				+			*	2	14
fatty acid potassium salt ΑΛ. ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ			+	+	+		+	+		*	4	0
abamectin ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ				+			+	+		*	2	28
acequinocil ΑΣΕΚΙΝΟΣΥΛ								+		*	1	14
deltamethrin ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	+		+	+	+					*	1	7
	+		+	+						*	2	
deltamethrin ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ (ετοιμόχρηστο δόλωμα)						+				*	1	
hexthiazox ΕΞΥΘΙΑΖΟΞ								+		*	1	35
emamectin ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ	+									ΜΗΛΙΑ	3	3
etoxazol ΕΤΟΞΑΖΟΛ								+		*	1	28
etofenprox ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ	+									ΜΗΛΙΑ	3	7
thiacloprid ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ	+		+				+			*	1 ή 2	14
thiamethoxam ΘΕΙΑΜΕΘΟΞΑΜ			+							*	2	14
imidacloprid ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΡΙΠΙΝΤ				+						ΑΧΛΑΔΙΑ	1	7
indoxacarb ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ	+									*	3	10
virus granulosis ΙΟΙ ΚΟΚΚΙΩΣΕΩΝ	+									*	9 ή 10	3 ή 1 (ανάλογα το σκεύασμα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
kaolin ΚΑΟΛΙΝ				+						ΑΧΛΑΔΙΑ	2 - 4	Πριν την άνθηση
clothianidin ΚΛΟΘΙΑΝΙΝΤΙΝ			+							*	1	14
clofentezine ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ								+		*	1	35
lamda-cyhalothrin ΛΑΜΔΑ-ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+		+	+			+			*	2	7 ή 9 (ανάλογα το σκεύασμα)
methoxyfenozide ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ	+						+			*	3	14
milbemectin ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ								+		ΜΗΛΙΑ	2	14
beta-cyfluthrin ΜΠΕΤΑ-ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	+			+			+			*	2	7
ΝΤΟΝΤΕΚΑΤΙΕΝ 1 -ΟΛ (παρεμπόδιση σύζευξης)	+									*	1 ως 2	0 ως 3
diflubenzuron ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ	+			+			+			*	4	30
paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ		+	+	+	+			+		*	4	21
paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ		+	+	+	+			+		*	1	Στο λήθαργο
pirimicarb ΠΙΡΙΜΙΚΑΡΜΠ			+							*	2	21
pyridaben ΠΥΡΙΝΤΑΜΠΕΝ								+		ΜΗΛΙΑ	1	20
pyriproxyfen ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ					+					*	1	Πριν την άνθηση
Spirotetramat ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ			+	+	+					*	2	21
spinosad ** ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ **	+			+			+			*	3	ΑΧΛΑΔΙΑ : 7/14 ΜΗΛΙΑ :7
spirodiclofen ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ								+		*	1	14
cyfluthrin ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	+			+			+			*	1	7
tebufenozide ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ	+						+			*	4	14
tebufenpyrade ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ								+		*	1	21
fenoxy carb ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ	+			+	+		+			*	2	ΜΗΛΙΑ:20 ΑΧΛΑΔΙΑ:30

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
fenpyroximate ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΪΤ								+		ΜΗΛΙΑ	1	7
flonicamid ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ			+							*	3	21
tau - fluvalinate ΤΑΟΥ - ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ	+		+	+			+			*	2	90
phosmet ΦΟΣΜΕΤ	+	+		+	+		+			*	2	28
chloranthraniliprole ΧΛΩΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ	+						+			*	2	14
chloranthraniliprole+abamectin ΧΛΩΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ+ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ	+			+			+	+		*	2	14
chlorpyrifos ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ	+	+			+		+		+	*	1 - 2	30
chlorpyrifos-methyl ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ	+	+	+	+	+					*	1	21

\* Έγκριση και σε Μηλιά και σε Αχλαδιά

\*\* Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή με spinosad μετά από εφαρμογή για ψύλλα 14 ημ., για άλλα έντομα 7 ημ. .

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, δεν αντικαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις.**

**Σε κάθε περίπτωση διαβάστε σχολαστικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα συσκευασίας.**

**Ηράκλειο Μάρτιος 2014**