



## № 1 / 16 Ιανουαρίου 2014

Υφούλης Αντώνης

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ  
**ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

### **ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΕΛΙΑΣ**

*(Spilocaea oleagina (Castagne) Hughes)*

- Ο ήπιος χειμώνας παρατείνει την περίοδο των φθινοπωρινών μολύνσεων και μέσα στο χειμώνα, διότι ο μύκητας διαπαύει ελάχιστα.
- Η μόλυνση γίνεται απαραίτητα με σταγόνα νερού (βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 2-3 ημέρες) που βοηθάει τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα, σε θερμοκρασία 7-25°C με άριστο τους 12°C. Οι συνθήκες των τελευταίων ημερών πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
- Συνιστάται άμεση επέμβαση σε ελαιώνες με έντονο πρόβλημα, ή όπου δεν έγιναν επεμβάσεις τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο, ή σε υγρές περιοχές, σε νεαρά δενδρύλλια, σε πυκνές φυτεύσεις και σε ελαιώνες όπου ενδημεί η ασθένεια.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Calcium copper sulfate, Copper hydroxide, Copper oxide, Copper oxychloride, Dodine, Kresoxim-methyl, Tribasic copper sulfate.
- Εάν επιλεγεί ο βορδιγάλειος ή ο οξυχλωριούχος χαλκός να ληφθεί υπόψη ότι προκαλούν πτώση των προσβεβλημένων φύλλων. Ειδικότερα ο οξυχλωριούχος προκαλεί και πτώση υγιών φύλλων σε υγρές περιοχές. Συνιστάται η εφαρμογή του οξυχλωριούχου χαλκού να αποφεύγεται στις πολύ υγρές περιοχές.
- Η φυλλόπτωση των προσβεβλημένων φύλλων σε ελαιώνες είναι επιθυμητή διότι λειτουργεί εξυγιαντικά, όμως σε πολύ προσβεβλημένους ελαιώνες μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην απόδοση των δέντρων και καλό είναι να αποφεύγεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη