

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 29 / 16 Μαΐου 2016

ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

(*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)

- Η πτήση της Καρπόκαψας συνεχίζεται στις περισσότερες περιοχές.
- Σε οπωρώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας με μια επαναληπτική επέμβαση αυτής που είχε προταθεί στο δελτίο νο 23-22/4.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με την ημερομηνία της προηγούμενης επέμβασης και τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού που είχε επιλεγθεί (υπολογίστε τον αριθμό ημερών για επανάληψη του φυτοπροστατευτικού).
- Ενδεικτικά, το χρονικό διάστημα επέμβασης κυμαίνεται στις **16-20 Μαΐου**.

ΣΑΝ ΖΟΖΕ, Ψώρα του San José

(*Quadraspidiotus perniciosus*, Homoptera: Diaspididae)

- Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες).
- Οι επεμβάσεις για την Καρπόκαψα της Μηλιάς επιτυγχάνουν ικανοποιητική καταπολέμηση του Σαν Ζοζέ.
- Μόνο σε **σοβαρές προσβολές** συστήνεται ξεχωριστή επέμβαση 19-21 Μαΐου.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Buprofezin (1), Chlorpyrifos-methyl (1), Fenoxycarb (2), Paraffin oil (4), Spirotetramat (2).

ΩΙΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ

(*Podosphaera leucotricha* Ell. and Ev. Salm.)

- Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας του καρπιδίου με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα.
- Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.
- Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενα δελτία.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ και ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, *Anarsia lineatella* Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Η πτήση της Ανάρσιας και του Φυλλοδέτη συνεχίζεται με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές.
- Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από τα συγκεκριμένα έντομα με μια επαναληπτική επέμβαση αυτής που είχε προταθεί στο δελτίο νο 22-21/4, κυρίως στις ποικιλίες που θα συγκομιστούν τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με την ημερομηνία της προηγούμενης επέμβασης και τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού που είχε επιλεγεί (υπολογίστε τον αριθμό ημερών για επανάληψη του φυτοπροστατευτικού).
- Ενδεικτικά, το χρονικό διάστημα επέμβασης κυμαίνεται στις **16-20 Μαΐου**.
- **Προσοχή** να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.
- Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την Ανάρσια δόθηκαν στο δελτίο νο 20-15/4 και για τον Φυλλοδέτη στο δελτίο νο 22-21/4. Με κατάλληλη επιλογή φυτοπροστατευτικού μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονη καταπολέμηση των δύο εντόμων.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη μολύνσεων.
- Προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
- Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν την συγκομιδή μειώνει τις μετασυλεκτικές σήψεις.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αριθμός ημερών έως την συγκομιδή):
 - Bacillus subtilis strain QST 713, Fenbuconazole, Fluopyram + Tebuconazole, Iprodione, Thiophanate-methyl (3)
 - Boscalid + Pyraclostrobin, Cyprodinil, Cyprodinil + Fludioxonil, Difenoconazole, Tebuconazole, Tebuconazole + Trifloxystrobin (7)
 - Propiconazole (14)

Ο Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης