

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ**
Ταχ. Δ/νση: Τορούτζια-Νικολαΐδη
Τ.Κ. 38334 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 66525
Fax: 24210 69545
e- mail: fyto12@otenet.gr

Πληροφορίες: Μsc Ι. Παππά, Δρ. Μόσχος
Θεόδωρος, Δρ. Ανδρέογλου Φωτεινή

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων:
- βλάπτει την υγεία των
καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

**ΑΚΡΟΔΡΥΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
No 4 /5-5-2014.**

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Η πτήση των ακμαίων της πρώτης γενιάς έχει ξεκινήσει στις πεδινές περιοχές. Στις ποικιλίες όπου ο νεαρός καρπός φθάνει σε διάμετρο μεγαλύτερη από το 1 εκατοστό, συστήνεται ο πρώτος ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Η επέμβαση αυτή αποβλέπει στην θανάτωση των ακμαίων ή των νεαρών προνυμφών πριν αυτές μπουνε μέσα στο μικρό καρύδι. Η επανάληψη του ψεκασμού εξαρτάται από το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε, τις καιρικές συνθήκες και το ρυθμό ανάπτυξης του καρπού.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: chlorantraniliprole, deltamethrin, *Cydia pomonella granulosis virus*, (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol (φερομόνη φύλου για καταπολέμηση της καρπόκαψας μέσω της παρεμπόδισης της σύζευξης).

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

Ο βροχερός καιρός ευνοεί την μόλυνση και την εξάπλωση της ασθένειας για την οποία έχει γίνει ήδη αναφορά σε προηγούμενο ΔΓΠ (3/3-4-2014). Σε όσες καλλιέργειες βρίσκονται σε ευαίσθητο για την μόλυνση από την ασθένεια στάδιο, (άνθιση και μέχρι το πέρας της καρπόδεσης), θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με την μικρότερη συνιστώμενη δόση. Εφόσον επικρατούν βροχερές καιρικές συνθήκες και μετά την καρπόδεση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασμός σε περιοχές με ιστορικό προσβολών από την ασθένεια.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: *Copper hydroxide, Copper oxide, Copper oxychloride.*

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

Ο βροχερός – υγρός καιρός που επικρατεί ευνοεί την εξέλιξη και διασπορά της ασθένειας. Σε περιοχές όπου υπάρχει ιστορικό προσβολών συνίσταται ψεκασμός με ένα κατάλληλο για το στάδιο και την καλλιέργεια μυκητοκτόνο, για την προστασία των νεαρών καρπών και της βλάστησης.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: *Copper hydroxide, Copper oxychloride Calcium copper sulfate, Tribasic copper sulfate, Boscalid+Pyraclostrobin, Myclobutanil.*

- **Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων**
- **Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.**
- **Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρυδιά, παρακαλούνται να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία μας, στη διεύθυνση: fyto12@otenet.gr**

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

Λύκας Δημήτρης