

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkrpfhgr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής – Βαγγέλης Α. Αλατσατιανός

2.



Βαλάνινος. Το σκαθάρι.



Βαλάνινος. Η προνύμφη και η ζημιά.



Καρπόκαμα. Προνύμφη και ζημιά.



Ζημιά από την προνύμφη του *Pammene fasciana*

<p>ΒΑΛΑΝΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ: (<i>Curculio elephas</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Σημείωση:</p>	<p>–Είναι μικρό σκαθάρι με μεγάλο ρύγχος που προσβάλλει τα κάστανα λίγο πριν την ωρίμανση.</p> <p>–Έχει μια γενιά το χρόνο. Γεννά τα αυγά του μέσα στον καρπό από τα τέλη Αυγούστου (πρώιμες περιοχές), οι περισσότερες όμως ωοτοκίες παρατηρούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ανάλογα με την πρωιμότητα της περιοχής και της ποικιλίας.</p> <p>–Οι προνύμφες του εντόμου προκαλούν κάθε χρόνο σοβαρές ζημιές στα κάστανα του νομού Χανίων</p> <p>–Η αντιμετώπιση του εντόμου γίνεται εναντίον των ακμαίων (σκαθάρια) πριν αυτά ωοτοκήσουν στους καρπούς.</p> <p>Συνιστάται στις <u>πρώιμες ποικιλίες & περιοχές</u> ένας ψεκασμός κάλυψης το διάστημα: 6 - 10 Αυγούστου.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση <u>συνιστάται να γίνεται πάντα συλλογή και καταστροφή όλων των πεσμένων προσβεβλημένων καστανών</u> για τη μείωση των πληθυσμών της επόμενης χρονιάς. Οι προνύμφες μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης τους στον καρπό πέφτουν στο έδαφος όπου περνούν τον χειμώνα και τα ενήλικα βγαίνουν την επόμενη χρονιά, την ίδια εποχή, στις ίδιες θέσεις.</p>
<p>ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ: (<i>Pammene fasciana</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Συνεχίζεται η καταγραφή ενηλίκων στο δίκτυο παρακολούθησης του εντόμου καθώς και οι προσβολές στους καρπούς. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται υψηλά ποσοστά προσβολής.</p> <p>Ο ψεκασμός εναντίον του βαλάνινου των καστανών μειώνει ικανοποιητικά τους πληθυσμούς του <i>Pammene fasciana</i>.</p>
<p>ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ: (<i>Laspeyresia splendana</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>–Είναι μια μικρή πεταλούδα που γεννά σε φύλλα που βρίσκονται κοντά σε κάστανα, τα οποία στη συνέχεια προσβάλλουν οι εκκολαπτόμενες προνύμφες.</p> <p>–Στο νομό Χανίων σε ορισμένες περιοχές προκαλεί ζημιές, μικρότερες όμως σε σχέση με τον βαλάνινο και το σκουλήκι των νεαρών καστανών</p> <p>–Στο δίκτυο παρακολούθησης καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί του εντόμου.</p> <p>Με την επέμβαση και τα προτεινόμενα καλλιεργητικά μέτρα που συστήθηκαν για τον βαλάνινο επιτυγχάνεται ικανοποιητική αντιμετώπιση της καρπόκαψας.</p>

ΦΑΡΜΑΚΑ: Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την καλλιέργεια της καστανιάς και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή είναι: ορισμένα σκευάσματα με δραστική ουσία *deltamethrin* (30ημ.) ορισμένα με δραστική *lambda cyhalothrin* (14ημ.) και το *chlorantraniliprole* (21ημ.) (*Coragen 20 SC*).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το Τεχνικό Δελτίο για την καλλιέργεια της καστανιάς στο ν. Χανίων εκδίδεται σε συνεργασία με το Τ.Α.Α. Χανίων, το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου της ΔΑΟΚ Χανίων και την “Αναπτυξιακή Ενδιά Χωριών”.

Ηράκλειο 4 Αυγούστου 2015
 Η Προϊσταμένη Τμήματος
 Κληρονόμου Ευφροσύνη