

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 22 / 21 Απριλίου 2016

ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Ξεκίνησε η 1^η πτήση του εντόμου.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

| | | Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο) |
|--|-----------------------|--|
| Εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων | 27-30 Απριλίου | Bacillus thuringiensis spp. Aizawai (2) |
| Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών | 22-25 Απριλίου | Methoxyfenozide (3) |
| Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών | 27-30 Απριλίου | Chlorpyrifos-methyl (1), Deltamethrin (1), Etofenprox (2), Lambda cyhalothrin (2) |

- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Σε περίπτωση που έγινε πρόσφατα η επέμβαση για την Ανάρσια (δελτίο νο 20-15/4), οι ημερομηνίες για την καταπολέμηση του Φυλλοδέτη μπορούν να μετατεθούν 3 ημέρες αργότερα, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστική ουσία που επιλέχτηκε για την Ανάρσια καταπολεμά αποτελεσματικά και τον Φυλλοδέτη.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Νικολάου Σταυρούλα