



Ακμαίο ευ데미δας

Προνύμφη ευ데미δας

Βοτρυτης

Ωίδιο

Ταχ. Δίψη:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ.: 2510800421

Fax: 2510800430

Πληροφορίες: Κ. Λίλης-Δ.Πουργιώτη-
Θ. Μαρκόπουλος.

Τηλ:2510-600421-422-420

Αρ. Δελτίου:11/03-09-13

ΑΜΠΕΛΙ

I. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Ξεκίνησε η δ' πτήση του εντόμου της ευ데미δας. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως υψηλός. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος προσβολής των σταφυλιών, ιδιαίτερα στις όψιμες ποικιλίες.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν προληπτικά οι παρακάτω ψεकाσμοί:

- **04 -05 Σεπτεμβρίου** στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές και
- **06- 07 Σεπτεμβρίου** στις όψιμες περιοχές

Επανάληψη μετά από **8-9** ημέρες λαμβάνοντας υπόψη την υπολειμματική διάρκεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και κυρίως σκευάσματα του βάκιλλου θουριγγίας.

II.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν, σε συνδιασμό με την καταπολέμηση της ευ데미δας. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια υγρών περιοχών, όψιμων ποικιλιών και όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο κατά το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.



Συστη χρήση
φυτοπροστατικών
σημαίνει



καλύτερη
φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν

III.ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Εμφανίζεται από το ξεκίμημα της ωρίμανσης των σταφυλιών και εκτείνεται κατά την πλήρη ωρίμανση. Παρατηρείται κυρίως σε αμπέλια όπου δεν έγινε σωστή αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Οφείλεται σε βακτήρια και ζαχαρομύκητες. Μεταδίδεται με το έντομο δροσόφιλα (μύγα του ξυδιού).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Σωστή καταπολέμηση της ευδεμίδας, αποφυγή πληγών στα σταφύλια, καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο σε συνδιασμό με μια πυρεθρίνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.
2. Να χρησιμοποιηθούν γ. φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση. Σταφύλια έτοιμα προς συγκομιδή δεν ψεκάζονται
3. Όλοι οι παραπάνω ψεκασμοί να γίνουν **μόνο** εφόσον λάβουμε υπόψη την **υπολειμματική διάρκεια** των γεωργικών φαρμάκων και το **στάδιο ωρίμανσης** των σταφυλιών και
4. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο

Προιστάμενος Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή