

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Ε. Σακκούλη, Κ. Ρήγας

ΕΛ: 6/16-9-2013

ΕΛΙΑ

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ:

Συμπτώματα: Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζονται κυκλικές κηλίδες χρώματος καφεκίτρινου και στη συνέχεια τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.

Συνθήκες μόλυνσης: Τα σπόρια για να βλαστήσουν και να προκληθούν νέες μολύνσεις χρειάζονται σταγόνα νερού από βροχή ή εξαιρετικά υψηλή υγρασία για 2-3 ημέρες και θερμοκρασία 9-25°C.

Επικρατούσες συνθήκες: Οι θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την εποχή, καθώς και οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε όλες τις περιοχές είναι πολύ πιθανόν να ευνοήσουν μολύνσεις.

Συστάσεις: **Ο ψεκασμός του φθινοπώρου, με την έναρξη των βροχών, θεωρείται βασικός σε όλες τις περιοχές που εμφανίζεται ακόμα και μικρή προσβολή. Σε περιοχές με πολύ έντονο πρόβλημα συνιστάται να γίνει και δεύτερος φθινοπωρινός ψεκασμός, ένα μήνα περίπου μετά τον πρώτο.**

Φάρμακα:

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡ.ΣΥΓΚ.	ΔΡΑΣΗ
Κρεσοξύμ μεθύλ	Βρώσιμες: μετά τη συγκομιδή Ελαιοποιήσιμες: 30	προληπτική ή/και θεραπευτική
Ντοντίν	15	προληπτική και θεραπευτική
Τριφλοξιστρομπίν	14	κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική
Χαλκός Βορδιγάλειος Χαλκός Θειικός Τριβασικός Χαλκός Οξυχλωριούχος Χαλκός Υδροξείδιο Χαλκός Υποξείδιο	21	προληπτική

ΣΗΜ: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ