

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkrfhgr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)



**Καρπόκαψα.** Προσβολή στον καρπό.  
Εξωτερικά διακρίνονται τα αποχωρήματα.



**Καρπόκαψα.** Εσωτερικά η προσβολή.  
Η προνύμφη δημιουργεί στοές, φτάνει  
μέχρι τα σπέρματα, τα οποία τρώει.



**Καρπόκαψα.** Εσωτερικά η προσβολή.  
Διακρίνεται η προνύμφη του εντόμου.



**Φουζικλάδιο.** Παλιά προσβολή σε καρπό  
(δερματώδης βούλα).



**Φουζικλάδιο.** Νέα προσβολή σε  
φύλλο (βελούδινη εξάνθηση).



**Βακτηριακό κάψιμο.** Σχηματισμός έλκους σε  
κλαδίσκο. Το βακτήριο διαχειμάζει στα έλκη.

**ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ**  
( Ο Ρ Ε Ι Ν Ε Σ – Ο Ψ Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ )

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Ευάγγελος Α. Αλατοσιανός

5.

<p><b>ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :</b> (<i>Carposcopsis pomonella</i>) (Μηλιά-Αχλαδιά-Καρυδιά)</p>	<p>Οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης συνεχίζονται αυξημένες. Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών στις ορεινές - όψιμες περιοχές (οροπέδιο Λασιθίου, οροπέδιο Κρουσώνα, Δαμάστα, κ.α.). <u>Ενδεικτικές ημερομηνίες καταπολέμησης: 4 - 6 Αυγούστου.</u> Σε αχλαδιές που πλησιάζουν στην ωρίμανση να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα ανάλογου χρόνου αναμονής για τη συγκομιδή. Να τηρείται αυστηρά το χρονικό διάστημα ασφαλείας από την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του φαρμάκου και απαιτείται για την προστασία των καταναλωτών.</p>
<p><b>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :</b> (<i>Fusicladium dendriticum</i>) (<i>Fusicladium pyrinum</i>) (Μηλιά - Αχλαδιά)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Η ασθένεια στο οροπέδιο Λασιθίου συντηρείται και επεκτείνεται τοπικά κοντά στις αρχικές θέσεις εκδήλωσής της. - Στις συνθήκες που επικρατούν συχνά την περίοδο αυτή στο οροπ. Λασιθίου (συνεχόμενες διυγράνσεις φύλλου από 8 - 13 ώρες ημερησίως με μέση θερμοκρασία κατά τις ώρες διύγρανσης τους 11 - 13 °C) σημειώνονται ελαφριές έως μέτριες νέες μολύνσεις με εμφάνιση συμπτωμάτων σε 9 - 10 ημέρες. Οδηγίες: Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών στο οροπέδιο Λασιθίου <b>μόνο</b> στα κτήματα που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα.</p>
<p><b>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ :</b> (<i>Erwinia amylovora</i>) (Αχλαδιά)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Στους προσβεβλημένους κλαδίσκους και κλάδους την περίοδο αυτή έχουν σχηματιστεί έλκη όπου θα διαχειμάσει το παθογόνο. - Οι συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας (χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία, απουσία βροχών) επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδίσκων και κλάδων. Οδηγίες: Να συνεχιστούν οι επιμελημένοι καθαρισμοί. Τα προσβεβλημένα τμήματα, να αφαιρούνται μαζί με υγιές τμήμα και να καίγονται άμεσα με προσοχή. <b>Υπενθυμίζεται ότι τα εργαλεία κλαδέματος πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε τομή με οινόπνευμα του εμπορίου.</b></p>

**ΦΑΡΜΑΚΑ:** Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουν αποσταλεί. Διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Ηράκλειο 2 Αυγούστου 2013  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Τρουλλάκης Ιωάννης