



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ:
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**
Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238

Πληροφορίες : **N. Πέττας Γεωπόνος MBA, MSC**

Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Φυτοπροστασίας


ΠΑΤΑΤΑ
Ν° 9 / 12-10-2015

Για τις περιοχές:
**ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ**

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις: Σε όλες τις περιοχές οι φθινοπωρινές πατάτες βρίσκονται σε ιδιαίτερο ευπαθές στάδιο στις προσβολές του παθογόνου. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών παραμένουν ευνοϊκές για προσβολές περονόσπορου. Παρόλη την πτώση της θερμοκρασίας η ελάχιστη θερμοκρασία παραμένει σε γενικές γραμμές πάνω από τους 10 °C, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ψηλά η ατμοσφαιρική υγρασία υποβοηθούμενες από τις βροχερές ημέρες.

Διάγρ. 1 Μετεωρολογικός Σταθμός Σαγαϊκών Αχαΐας



Συστάσεις: Σε όλες τις περιοχές συστήνεται η εντατικοποίηση της προστασίας για τον περονόσπορο με 5-μερες προστατευτικές εφαρμογές σύμφωνα με τις οδηγίες του τοπικού γεωπόνου από τις λίστες με τα εγκεκριμένα σκευάσματα έτους 2015 (έκδοση 19/02/2015). Από τα διεισδυτικά και διασυστηματικά μυκητοκτόνα χρησιμοποιείστε τις μεγαλύτερες συνιστώμενες δόσεις και το μικρότερο μεσοδιάστημα μεταξύ των ψεκασμών.

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΩΣΗ

Συνιστώνται εφαρμογές ανά 10ήμερο με σκευάσματα επαφής. Έναρξη επεμβάσεων με την εμφάνιση προσβολών ή όταν τα φυτά αρχίζουν να «αδυνατίζουν». Να ξεριζώνονται και να καταστρέφονται τα φυτά με ύποπτα συμπτώματα. Η ασφαλής διάγνωση να γίνεται με τον γεωπόνο – σύμβουλο της καλλιέργειας και μετά να ακολουθεί η συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον περονόσπορο με τα εγκεκριμένα σκευάσματα έτους 2015 (έκδοση 19/02/2015).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC