



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

38/7-7-15

**ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)**

**1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ**

**Διαπιστώσεις:** Ξεκίνησε η πτήση της δεύτερης γενιάς του εντόμου και στις ορεινές περιοχές. Στις πεδινές περιοχές βρίσκεται σε εξέλιξη με χαμηλές συλλήψεις.

**Οδηγίες-  
Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:**

**1. Μέχρι 9 Ιουλίου με:** *Αμπαμεκτίν+Χλοραντраниλιπρόλ, Φενοξυκάρμπι, Χλοραντраниλιπρόλ.*

**2. Από 10 μέχρι τις 13 Ιουλίου με:**

*Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες Μεθοξυφenoζάιντ, Ντιφλουμπενζουρόν.*

**3. Από 14 ως 17 Ιουλίου με:**

*Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπι, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

**Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:**

**1. Από 10 μέχρι τις 13 Ιουλίου με:**

*Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.*

**2. Από 14 ως 17 Μή με:**

*Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωπυριφός μεθύλ.*

**Στις οπωρώνες των πρώιμων περιοχών να γίνει επανάληψη της επέμβασης άμεσα.**

**2. ΝΑΡΚΗ - ΣΕΣΙΑ**

**Οδηγίες:** **Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.**

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Νάρκη:** *Αμπαμεκτίν+Χλοραντраниλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοσάντ, Τ-φλουβαλινείτ, Φενοξυκάρμπι, Φοσμέτ, Χλοραντраниλιπρόλ, Χλωρπυριφός.*

**Σέσια:** *Χλωρπυριφός.*

**3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ**

**Οδηγίες:**

**Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν τους τετρανύχους. Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.**



**Φυτ/κά**  
**Προϊόντα:**

*Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν(2) , Αμπαμεκτίν+Χλοραντраниλιπρόλ(1-2),  
Ασεκουινασίλ(1), Ετοξαζόλ(1), Μιλμπεμεκτίν (2)Μπιφenaζέιτ (1)  
Σπιροντκλοφέν (1) Τεμπουφενπυράντ(1)*

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Ο αριθμός δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνεται τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών.  
Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων)

**4. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ**

**Οδηγίες:**

**Σε οπωρώνες που διαπιστώνετε ενεργές κηλίδες του μύκητα, να συνεχιστεί η προστασία.** Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**