



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

27 / 19-5-15

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσεις: Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:

α) Πρώιμες περιοχές: Από 22 έως 25 Μάη

β) Όψιμες περιοχές: Από 26 ως 30 Μάη.

Σε οπωρώνες που έγινε επέμβαση για τον Κόκκο, να μην επέμβετε και για την ψώρα.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ (μόνο σε πορτοκαλιά και Γκρέιπ φρούτ) . Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις των αυγών του εντόμου είναι σε εξέλιξη. Οι εκκολαφθείσες προνύμφες κινούνται στη βλάστηση.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που την περσινή χρονιά υπήρχαν προσβολές, να γίνει **καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα** και οπωσδήποτε πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν πάνω στον καρπό. Ο ψεκασμός εναντίον αυτής της γενιάς είναι καθοριστικός για την καταπολέμηση του εντόμου. Οι επόμενες επεμβάσεις, απλά μειώνουν τους υπάρχοντες πληθυσμούς.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ (μόνο σε πορτοκαλιά και Γκρέιπ φρούτ) .

3.ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

Διαπιστώσεις Δεν έχει ξεκινήσει η εκκόλαψη. Παρακολουθούμε με συχνές δειγματοληψίες την εξέλιξη του εντόμου. Θα ενημερωθείτε σε

Οδηγίες: επόμενο δελτίο. ►

4.ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Διαπιστώσεις: Οι προσβολές είναι σποραδικές. Από δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των νεαρών προνυμφών και η παρουσία του ωφέλιμου.

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές και δεν υπάρχει το ωφέλιμο αρπακτικό, **να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.** Πριν αποφασίσετε για επέμβαση, καλό είναι να ελεγχθεί η ύπαρξη του ωφέλιμου αρπακτικού.

Φυτ/κά προϊόντα: *Θερινός πολτός, Χλωρυριφός, Χλωρυριφός-μεθύλ.*

5.ΚΟΚΚΟΣ (*Coccus hesperidum*)

Οδηγίες: Σε οπωρώνες με έντονες προσβολές να γίνει **επανάληψη της επέμβασης στο τέλος Μην.** (Βλέπε δελτίο 26 /14-5-15).

6.ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες: Υπάρχουν σοβαρές προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες. Με δεδομένο τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν (είναι φορείς ιώσεων - Τριστέσα), να γίνονται συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι και να επεμβαίνετε αναλόγως. (Βλέπε δελτίο 26 /14-5-15).

7.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Βλέπε δελτίο 26 /14-5-15.

Φυτ/κά προϊόντα:

8. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Διαπιστώσεις: Δεν έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα των δύο εντόμων. Θα

Οδηγίες: ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

9. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (*Aculops pelecassi*) –

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (*Eriophyes sheldoni*)

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που διαπιστωμένα τα ακάρεα δημιουργούν έντονες προσβολές και δεν έγινε προανθικός ψεκασμός να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά προϊόντα: *Θερινά λάδια .*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, που αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα.
2. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ