

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616  
Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

## Ε Χ Θ Ρ Ο Ι Τ Ω Ν Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ Ο Ε Ι Δ Ω Ν



Λεμόνι προσβεβλημένο από κόκκινη ψώρα.



Παρλατόρια (μαύρη ψώρα) σε πορτοκάλι.



Αποικίες διαλευρώδη στην κάτω επιφάνεια του φύλλου.



Προνυμφικές στοές φυλλοκνίστη στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και παραμόρφωση.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη – MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη

3.

|   |   |
|---|---|
| <b>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:</b><br>( <i>Ceratitis capitata</i> )   | Στο δίκτυο παγίδευσης οι συλλήψεις είναι μέτριες.<br>Να συνεχιστεί η προστασία στα όψιμα πορτοκάλια και στα γκρέι φρούτ που δεν έχουν συγκομισθεί.  |
| <b>ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ</b><br>( <i>Aonidiella aurantii</i> )<br><b>&amp; ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ</b><br>ή Μαύρη ψώρα<br>( <i>Parlatoria zizyphi</i> )<br>Οδηγίες: | Τα νεαρά στάδια της <u>δεύτερης γενιάς</u> και των δύο κοκκοειδών βρίσκονται σε εξέλιξη.<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Κλάδεμα και καθάρισμα των δέντρων περιορίζει τις προσβολές.</li><li>- Στα δέντρα όπου διαπιστώνονται προσβολές συστήνεται καταπολέμηση: Μεσσαρά, Σίσοες, Φόδελε, κ.ά. : <b>24 - 27 Ιουλίου</b> και ν. Χανίων : <b>28- 31 Ιουλίου.</b></li></ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Συστάσεις :</b> Προτείνεται επιλογή σκευασμάτων με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα. <u>Οι θερινοί πολτοί να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες κάτω των 32°C και σε καλά ποτισμένα δέντρα που βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση για να αποφευχθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.</u> Έντονες προσβολές αντιμετωπίζονται με μείγμα θερινού πολτού και άλλου εγκεκριμένου σκευάσματος όπου θα πρέπει να τηρείται το μεγαλύτερο «διάστημα αναμονής πριν τη συγκομιδή». Η δοσολογία της ανάμειξης είναι: <u>30-50% της αναγραφόμενης δόσης θερινού πολτού για ψεκάσμο κάλυψης και η ενδεδειγμένη δόση του εντομοκτόνου.</u></p>   |
| <p><b>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ:</b><br/>( <i>Planococcus citri</i> )</p> <p><b>Αντιμετώπιση:</b></p>  | <p>Σε περιοχές με υψηλή υγρασία αναπτύσσονται συνήθως επιζήμιοι πληθυσμοί. Οι νεαρές προνύμφες εγκαθίστανται σε σκιερά και υγρά μέρη του δέντρου (γύρω από τον κάλυκα, στα σημεία επαφής των καρπών μεταξύ τους ή με φύλλα και κλάδους, στην κοιλότητα του ομφαλού στις ομφαλοφόρες ποικιλίες).</p> <p>Σε δέντρα <u>προσβεβλημένα</u> συνιστάται κλάδεμα και επέμβαση στις ίδιες ημερομηνίες με την κόκκινη ψώρα. Όταν συνυπάρχουν και τα δύο κοκκοειδή συνιστάται συνδυασμένη αντιμετώπιση.</p>  |
| <p><b>ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:</b><br/>( <i>Phyllocnistis citrella</i> )</p> <p><b>Οδηγίες:</b></p> | <p>Διαπιστώνονται προσβολές στην τρυφερή βλάστηση και στους λαιμαργούς βλαστούς. Τα φύλλα αποκτούν αργυρόχρωμη όψη, καρουλιάζουν και η επιφάνειά τους καλύπτεται από στοές.</p> <p><u>Η ζημιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα νεαρά δενδρύλλια και στα τρυφερά εμβόλια.</u></p> <p>- <u>Να συνεχιστεί η προστασία σε <b>φυτόρια</b> και <b>νεαρά δέντρα</b> με ψεκασμούς κάλυψης, ανά διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.</u></p> <p>- <u>Δέντρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία ανέχονται προσβολές στο φύλλωμα χωρίς να υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης.</u> Αντιμετωπίζεται με απομάκρυνση των λαιμαργών βλαστών, αποφυγή όψιμης λίπανσης και περιορισμό των καλοκαιρινών και φθινοπωρινών αρδεύσεων ώστε να μην ενθαρρύνεται νέα βλάστηση την περίοδο που οι πληθυσμοί του εντόμου είναι υψηλοί.</p> |
| <p><b>ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ:</b><br/>( <i>Dialeurodes citri</i> )</p> <p><b>Οδηγίες:</b></p>       | <p>Πυκνό φύλλωμα και αυξημένη υγρασία ευνοούν την ανάπτυξη των αλευρώδων. Ο διαλευρώδης εκτός από απομυζήσεις χυμών <u>συμβάλλει στην ανάπτυξη της καπνιάς στα φύλλα.</u></p> <p>- Κατάλληλο κλάδεμα και αφαίρεση λαιμαργών βλαστών.<br/>- Περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις και κανονικές αρδεύσεις.</p> <p>Όπου διαπιστώνονται <u>έντονες προσβολές</u> συνιστάται ψεκάσμος στο διάστημα: <b>30 Ιουλίου - 2 Αυγούστου</b>. Εάν συνυπάρχουν προσβολές κοκκοειδών να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση.</p>  |
| <p><b>ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ:</b><br/>( <i>Aleurothrixus floccosus</i> )</p>                  | <p>Συνιστώνται τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον διαλευρώδη. Να αποφεύγονται επεμβάσεις που περιορίζουν τους φυσικούς εχθρούς του.</p>  |

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Επιλέγεται τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων πριν τη χρήση. Να προτιμηθούν σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα παρασιτοειδή και αρπακτικά.

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ:** Στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, η δραστική ουσία **deltamethrin** (δελταμεθρίν) εκτός από την Μύγα της Μεσογείου, τις αφίδες, τους αλευρώδεις και το λεκάνιο, πήρε έγκριση και για τα κοκκοειδή: κόκκινη ψώρα, παρλατόρια, λοιπά κοκκοειδή. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1, ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή 30.